

79. Dr. David Newman and William Rawsay, хирурги Глазговской больницы.—A Note on Decomposition of Chloroform and Sickness.—(Lancet, отъ 23 января 1897 г., р. 240).—Способы предупрежденія рвоты послѣ хлороформированія.

Если оперируемый вдыхаетъ хлороформъ, сберегавшійся обыкновеннымъ образомъ, т. е. въ пузырькѣ съ притертой пробкою и въ темномъ мѣстѣ, то у больного является тошнота со рвотой; если же хлороформъ свѣже-дистиллированный, рвоты не бываетъ или она очень легка, т. е. въ первомъ случаѣ рвоты обуславливаются разложениемъ хлороформа. Если же въ хлороформъ всыпать немного размельченной извести и профильтровать его, то такой хлороформъ не вызываетъ тошноты и рвоты. Въ подтвержденіе авторъ приводитъ нѣсколько исторій повторнаго наркоза: у одного больного 3 раза, у двухъ по 4 раза, при хлороформированіи первые разы обыкновеннымъ препаратомъ больные страдали тяжелою и продолжительною рвотой, а послѣдніе разы—рекомендуемымъ авторами препаратомъ—никакой рвоты не было.

М. Гинзбургъ.

80. Dr. James Braithwaite.—On the Connexion (if any) between mental and non puerperal Uterine Diseases.—(Lancet, July 3, 1897., р. 13).—О соотношеніи между психическими и не послѣродовыми болѣзнями матки.

По поводу одного случая, въ которомъ у нерожавшей женщины, страдавшей нѣсколько лѣтъ искривленіемъ матки кзади,—развился психозъ, не смотря на полное устраненіе припадковъ первой болѣзни (retroflexio) пессаріемъ Hodge'a, dr. Br. обсуждаетъ причинную связь между не пuerperальными маточными и психическими болѣзнями. Авторъ, на основаніи обширной гинекологической практики—болѣе 2000 больничныхъ наблюденій—отрицаетъ связь между ними. Онъ приводитъ другой случай, присланный ему однимъ нерво-патологомъ: у дамы одновременно съ психозомъ было искривленіе матки кзади, при чемъ матка давила на яичникъ; произведенная ventrofixatio устранила искривленіе кзади, а психозъ остался безъ переменъ. Въ подтвержденіе Br. приводитъ мнѣніе извѣстнаго англійскаго психолога д-ра Hood'a что „помѣшательство составляетъ послѣдствіе угнетенія, истощенія и раздражительности“.

М. Гинзбургъ.

81. Professor Smith (Bishop's college, Montreal, Canada).—Post-operative Haemorrhage from Nipping of the Ligature

after Removal of diseased tubes and ovaries; and how to prevent it.—(American Journ of. Obst., June 1897, p. 805).—**Какъ предотвратить кровотеченіе вслѣдствіе соскальзыванія лигатуръ послѣ изсѣченія маточныхъ придатковъ?**

Разобравъ явленія остраго малокровія, происходящаго вслѣдствіе соскальзыванія лигатуры съ культи послѣ гинекологическихъ операцій, авторъ описываетъ примѣняемый имъ способъ, который предупреждаетъ опасность соскальзыванія лигатуръ. Проф. *Smith*, до перевязки ножки опухоли, накладываетъ лигатуру на яичниковую артерію, легко ощупываемую у верхняго края широкой связки, на разстояніи одного дюйма отъ тазовой стѣнки. Когда помощникъ оператора оттягиваетъ одною рукою Ф. трубу, а другою—край брюшнаго разрѣза, операторъ подводитъ изогнутую иглу съ шелковою средней толщины лигатурой подъ яичниковую артерію и туго перевязываетъ послѣднюю двойнымъ узломъ, за тѣмъ перевязывается ножка опухоли подъ яичникомъ и у маточнаго конца трубы; концы послѣдней лигатуры обводятся подъ узломъ лигатуры яичниковой ножки и вновь завязываются *en masse*. При такомъ способѣ вторичное кровотеченіе послѣ удаленія придатковъ станетъ не возможнымъ.

При одной изъ послѣднихъ операцій Ф. трубы были утолщены и широкія связки были инфильтрованы и сращены съ петлями кишекъ. Проф. *Smith* перевязалъ яичниковую артерію по описанному способу. Передъ самымъ закрытіемъ брюшной раны, *S.* увидѣлъ, что лигатура соскользнула съ конца широкой связки, а вмѣстѣ съ нею обнаружился перерѣзанный конецъ *a. ovarialis* толщиной съ гусиное перо. Къ счастью, кровотеченія изъ яичниковой артеріи не показалось, ибо она была перевязана выше.

М. Гинзбургъ.

82. Dr. John Shober (Philadelphia).—A Case of Eclampsia successfully treated with large Doses of Veratrum Viride.—(American J. of Obst., June 1897, p. 783).—**Эклампсія, излѣченная большими дозами veratri viridi.**

У 27 перво-беременной, на 7-мъ мѣсяцѣ, появилась жестокая головная боль, на утро—2 приступа конвульсій 45—25 минутной продолжительности (?! ред.).

Въ мочѣ много бѣлка. $\frac{3}{4}$ грана морфія подкожно, $\frac{1}{2}$ драхмы хлорала и $\frac{1}{2}$ драхмы бром. натра въ первые сутки. Dr. *Sh.* назначилъ: extract. veratri viridi, по 20 капель черезъ 4 часа, утромъ и вечеромъ, по $\frac{1}{4}$ гр. морфія (сѣнок.) и слабительныя (пилюли и