

# РЕФЕРАТЫ.

## Обзоръ акушерско-гинекологической литературы.

### а) Русской.

29. А. Редлихъ. Къ вопросу о примѣненіи обезпложивающаго метода при чревосѣченіяхъ въ частной практикѣ. (Протокъ засѣд. Акуш.-Гин. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, стр. 161).

Авторъ передаетъ въ статьѣ принципы обезпложиванія, которыхъ придерживается проф. Г. Е. Рейнъ. Признавая необходимымъ заботиться о чистотѣ воздуха операціонной комнаты, проф. Г. Е. Рейнъ дѣлаетъ чревосѣченія въ частной практикѣ въ палаткѣ, предложенной проф. Субботинымъ. Въ такой палаткѣ онъ сдѣлалъ пять чревосѣченій съ благоприятными результатами. Бактеріологическія изслѣдованія воздуха палатки показали ея полную асептичность. Ввиду однако того, что палатка содержитъ мало воздуха и температура послѣдняго во время операціи очень повышается, авторъ считаетъ необходимымъ устройство въ палаткѣ вентиляціонныхъ приспособленій. Н. Какушкинъ.

30. А. Редлихъ. Случай коренной операціи грыжи бѣлой линіи во время беременности. (Протокъ засѣд. Акуш.-Гинек. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, 1894 г., стр. 153).

У 39-лѣтней беременной, на 3 мѣсяцѣ, имѣется въ области пупка опухоль въ 39,5 снтм. въ окружности основанія. Кожа опухоли (грыжи) истончена; грыжа не вправима. При операціи (разрѣзъ по бѣлой линіи) оказалось, что содержимое грыжи составляли кишечныя петли и сальникъ. Часть послѣдняго ампутирована. Грыжевое кольцо разрѣчено и содержимое мѣшка вправлено.

Грыжевой мѣшокъ резецированъ и грыжевое отверстіе съ кожной раной зашиты глубокими и поверхностными швами. Получился успѣхъ.

*Н. Какуткинъ.*

31. Д. А. Карра. Случай haematocolpos et haematometra unilateralis. (Проток. засѣд. Акуш.-Гин. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, 1894 г., стр. 149).

Крестьянка 20 лѣтъ. Крови съ 15 лѣтъ, черезъ неправильные промежутки, въ послѣднее время болѣзненныя. Въ животѣ больной ощущается опухоль, быстро растущая. Она по формѣ напоминаетъ однорогую матку. Продолженіемъ ея во влагалищѣ находится опухоль по правой стѣнкѣ, простирающаяся до самаго входа во влагалище. Опухоль опорожнена троакаромъ со стороны влагалища и оказалась содержащею кровь. Отверстіе расширено ножомъ, полость затампонирована. Въ данномъ случаѣ имѣлось дѣло, слѣдовательно, съ двойной маткой и съ двойнымъ влагалищемъ. Авторъ, кромѣ этого случая, упоминаетъ кратко о двухъ другихъ, подобныхъ описанному, наблюдавшихся въ той же (Кіевской) клиникѣ.

*Н. Какуткинъ.*

32. Н. Гржибовскій. Разрывъ матки во время родовъ; чрево-сѣченіе; выздоровленіе. (Проток. засѣд. Акуш.-Гинек. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, 1894 г., стр. 135).

На 59681 родовъ, собранныхъ авторомъ въ русской литературѣ, разрывы наблюдались 65 разъ (1 на 1053 родовъ); на 2104061 родовъ, собранныхъ въ иностранной литературѣ, разрывы наблюдались 1034 раза (1:1940). Случай автора касается 25-лѣтней роженицы, беременной въ седьмой разъ. Предыдущіе роды были въ общемъ трудны. Настоящіе роды съ сильными схватками. Послѣ отхожденія большого количества водъ, при зѣвѣ, открытомъ на 3 пальца, прекратились схватки и появилось небольшое кровотеченіе. Опредѣленъ полный разрывъ матки и начинающійся перитонитъ, при общемъ упадкѣ силъ больной. Размѣры таза правильны. Чревосѣченіе обнаружило типическій разрывъ по передней поверхности нижняго сегмента матки, съ полнымъ выходомъ плода и послѣда въ брюшную полость. Матка ампутирована. Каналъ шейки дренажированъ стеклянной трубкой, выполненной іодоформной марлею. Брюшная полость вымыта борнымъ растворомъ. Больная выздоровѣла. Авторъ собралъ 23 надвлагалищныхъ ампутацій при разрывахъ матки съ 13 выздоровленіями.

*Н. Какуткинъ.*