

33. В. Г. Клячкина. Случай неукротимой рвоты у беременной при ущемлении въ тазу дермоидной кисты яичника. (Проток. засѣд. Акуш.-Гинек. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, стр. 169).

Больная 26 лѣтъ. На первомъ мѣсяцѣ беременности началась рвота. Слѣва матки опредѣлялась прочно сидѣвшая въ маломъ тазу опухоль съ среднее яблоко, дававшее поводъ предполагать здѣсь вѣматочную беременность. Въ теченіе почти 2 мѣсяцевъ рвота не уступала лѣченію. Чревосѣченіемъ опухоль, оказавшаяся кожевикомъ на ножкѣ, легко удалена. Послѣ операціи рвота прекратилась и больная выздоровѣла. На основаніи своего случая и литературныхъ данныхъ, авторъ заключаетъ, что причиной неукротимой рвоты могутъ служить опухоли придатковъ матки, особенно, если онѣ являются причиной смѣщенія матки и сами ущемляются въ тазу. Чревосѣченіе въ такихъ случаяхъ безусловно показано.

Н. Какушкинъ.

34. В. С. Груздевъ. Къ вопросу объ одиночной перевязкѣ пуповины. (Врачъ, 1895 г., №№ 7, 8 и 9).

Изъ обширнаго литературнаго очерка, приведеннаго авторомъ, видно, что въ настоящее время относительно достоинствъ того или другого способа веденія послѣдоговго періода существуютъ среди акушеровъ разнообразныя взгляды. Въ общемъ способы веденія послѣдоговго періода сводятся къ выжидательнымъ приѣмамъ (*Ahlfeld*) и къ активному вѣмшательству (*Credé*). Авторъ, отмѣчая недостатки того и другого методовъ, задается вопросомъ, не въ состояніи-ли будетъ одиночная перевязка пуповины (плодоваго конца), сгладить дурныя стороны способа *Credé* и способа *Ahlfeld*'а, сохранивъ ихъ достоинства. Онъ провелъ 80 послѣдоговхъ періодовъ, по *Credé*, съ одиночной перевязкой пуповины, при чемъ получилъ слѣдующіе результаты. Въ среднемъ продолжительность послѣдоговго періода равнялась 1½ минутамъ. Среднее количество кровопотери равнялось 176 грм. Отрывъ оболочекъ наблюдался однажды. Мѣстныхъ послѣдоговхъ заболѣваній не было. Послѣдъ былъ обезкровленъ, представлялся плотнымъ, сморщеннымъ. Безусловно выжидательный методъ съ одиночной перевязкой пуповины, авторъ наблюдалъ въ 30 случаяхъ. Послѣдоговй періодъ здѣсь равнялся въ среднемъ 31 минутѣ. Отрывовъ оболочекъ не было. Въ среднемъ роженица теряла крови 622 грм. Послѣдъ былъ обезкровленнымъ, представлялся вилымъ, пустымъ. Въ 20 случаяхъ авторъ наливалъ послѣдъ черезъ пупочную вену, или холодной или теплой водой. Послѣдоговй періодъ въ этихъ случаяхъ въ среднемъ = 58 мину-