

тамъ. Онъ былъ короче при наливаніи холодной воды и длиннѣе при наливаніи теплой. При большей массѣ наливаемой воды послѣдъ выдѣлялся скорѣе, вслѣдствіе, какъ показали опыты автора, просачиванія жидкости въ пространства между послѣдомъ и стѣнкой матки.

*Н. Какушкинъ.*

**35. М. О. Клейнманъ. Случай влагалищной перегородки, послужившей препятствіемъ во время родовъ.** (Проток. засѣд. Акуш.-Гинека. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, 1894 г., стр. 67).

Primipara 19 лѣтъ. Предлежатъ ножки (въ выходѣ). При извлеченіи за ножку оказалось, что мясистая перекладина, идущая отъ передней влагалищной стѣнкѣ къ задней, попала въ ягодично-бедренную складку плода и мѣшала извлеченію туловища. Ее удалось смѣстить въ сторону, но потомъ она попала въ подкрыльцовую впадину. Авторъ ее перерѣзалъ между двумя лигатурами и извлекъ плодъ. Перекладина была толщиной въ гусиное перо.

*Н. Какушкинъ.*

**36. Г. Л. Грауерманъ. По поводу случая rupturae uteri completae sub partu съ исходомъ въ выздоровленіе.** (Врачебныя Записки, 1895 г. № 4).

Авторъ былъ позванъ къ роженицѣ, 26 лѣтъ, раньше 4 раза разрѣшавшейся благополучно. Теперь роды ея продолжались безуспѣшно уже 3 дня. Она была найдена авторомъ въ состояніи крайняго упадка силъ, очень малокровной. Наружнымъ изслѣдованіемъ опредѣлено присутствіе въ животѣ двухъ опухолей, не равной величины. Неточный анамнезъ и отсутствіе сердцебіенія плода заставили автора сомнѣваться въ наличности беременности. При внутреннемъ изслѣдованіи найдены на мѣстѣ зѣва и шейки какіе-то лоскуты ткани. Изслѣдующая рука свободно проникала въ брюшную полость и ощупала ручку плода и кишечныя петли. Произведенъ поворотъ на ножку и извлеченіе плода. Вслѣдъ за плодомъ выпали кишечныя петли и какая-то опухоль на длинной тонкой ножкѣ, похожая на почку. Авторъ полагаетъ, что это было какое-то новообразование (?). Кишечныя петли и опухоль вправлены, при чемъ удаленъ свободно лежавшій въ нижнемъ отдѣлѣ матки послѣдъ. Авторъ рѣшаетъ, что здѣсь былъ полный разрывъ матки въ нижнемъ сегментѣ, въ шейкѣ и даже въ верхнемъ отдѣлѣ рукава, вызванный запущеннымъ поперечнымъ положеніемъ плода. Большая выздоровѣла, хотя поправлялась очень долго. Сдѣлавъ обзоръ соотвѣтствующей литературы, авторъ справедливо замѣ-

чаетъ, что вопросъ о предпочтительности хирургическаго или сохраняющаго способа лѣченія при разрывахъ матки остается нерѣшеннымъ.

*Н. Какушкинъ.*

37. Ю. Аншелесъ. Къ казуистикѣ уродствъ женской половой сферы у взрослыхъ. (Проток. засѣд. Акуш.-Гинек. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, 1894 г., стр. 125).

Описано два случая: 1) *Atresia ani vestibularis* у 19-лѣтней еврейки, подвергавшейся безуспѣшно операціи на 3-мъ мѣсяцѣ жизни. Входъ въ прямую кишку, прикрытый клапаномъ, находится въ нижнемъ отдѣлѣ влагалища, почти во входѣ его. 2) *Defectus genitalium internorum* у 26-лѣтней еврейки. Наружные половые органы нормальны. Влагалище представляетъ слѣпой мѣшокъ въ 2½ снтм. длиной, способный растягиваться до 6—7 снтм. Внутреннихъ половыхъ органовъ объективно опредѣлить не удалось. *Molimina menstrualia* у больной отсутствуютъ.

*Н. Какушкинъ.*

38. Д. Абуладзе. Къ вопросу о вліяніи заболѣванія холерою на теченіе беременности. (Проток. засѣд. Акуш.-Гинек. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, 1894 г., стр. 111).

Изъ наблюдавшихся авторомъ пяти случаевъ, въ четырехъ беременность прервалась, при чемъ погибла и одна мать, въ одномъ случаѣ беременная умерла не разрѣшившись; плоды во всѣхъ случаяхъ погибли. Не смотря на то, что во всѣхъ случаяхъ были наблюдаемы сильныя судороги икроножныхъ мышцъ, матка оставалась вялой. Только съ прекращеніемъ холернаго приступа, когда больныя находились на пути къ выздоровленію, начиналась изгоняющая дѣятельность матки. Во всѣхъ случаяхъ движенія плода прекращались одновременно съ наивысшимъ развитіемъ холернаго приступа. Авторъ думаетъ, что причиной смерти плода является пониженіе кровяного давленія (вслѣдствіе потери соковъ организма), сгущеніе крови, обѣднѣніе ея кислородомъ.

*Н. Какушкинъ.*

39. А. Н. Афанасьевъ. Къ вопросу о микроорганизмахъ послѣродовыхъ отдѣленій. (Проток. засѣд. Акуш.-Гинек. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, 1894 г., стр. 79).

Авторъ изслѣдовалъ выдѣленія 29 родильницъ, изъ которыхъ у 20 послѣродовой періодъ протекалъ правильно и у 9 съ осложненіями. Выдѣленія изслѣдовались въ различные дни послѣродоваго періода. Для собиранія лохій изъ различныхъ отдѣловъ