

часть, что вопросъ о предпочтительности хирургическаго или сохраняющаго способа лѣченія при разрывахъ матки остается нерѣшеннымъ.

*Н. Какушкинъ.*

37. Ю. Аншелесъ. Къ казуистикѣ уродствъ женской половой сѣры у взрослыхъ. (Проток. засѣд. Акуш.-Гинек. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, 1894 г., стр. 125).

Описано два случая: 1) *Atresia ani vestibularis* у 19-лѣтней еврейки, подвергавшейся безуспѣшно операціи на 3-мъ мѣсяцѣ жизни. Входъ въ прямую кишку, прикрытый клапаномъ, находится въ нижнемъ отдѣлѣ влагалища, почти во входѣ его. 2) *Defectus genitalium internorum* у 26-лѣтней еврейки. Наружные половые органы нормальны. Влагалище представляетъ слѣпой мѣшокъ въ 2½ снтм. длиной, способный растягиваться до 6—7 снтм. Внутреннихъ половыхъ органовъ объективно опредѣлить не удалось. *Molimina menstrualia* у больной отсутствуютъ.

*Н. Какушкинъ.*

38. Д. Абуладзе. Къ вопросу о вліяніи заболѣванія холерою на теченіе беременности. (Проток. засѣд. Акуш.-Гинек. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, 1894 г., стр. 111).

Изъ наблюдавшихся авторомъ пяти случаевъ, въ четырехъ беременность прервалась, при чемъ погибла и одна мать, въ одномъ случаѣ беременная умерла не разрѣшившись; плоды во всѣхъ случаяхъ погибли. Не смотря на то, что во всѣхъ случаяхъ были наблюдаемы сильныя судороги икроножныхъ мышцъ, матка оставалась вялой. Только съ прекращеніемъ холернаго приступа, когда больныя находились на пути къ выздоровленію, начиналась изгоняющая дѣятельность матки. Во всѣхъ случаяхъ движенія плода прекращались одновременно съ наивысшимъ развитіемъ холернаго приступа. Авторъ думаетъ, что причиной смерти плода является пониженіе кровяного давленія (вслѣдствіе потери соковъ организма), сгущеніе крови, обѣднѣніе ея кислородомъ.

*Н. Какушкинъ.*

39. А. Н. Афанасьевъ. Къ вопросу о микроорганизмахъ послѣродовыхъ отдѣленій. (Проток. засѣд. Акуш.-Гинек. Общ. въ Кіевѣ, томъ 7, 1894 г., стр. 79).

Авторъ изслѣдовалъ выдѣленія 29 родильницъ, изъ которыхъ у 20 послѣродовой періодъ протекалъ правильно и у 9 съ осложненіями. Выдѣленія изслѣдовались въ различные дни послѣродоваго періода. Для собиранія лохій изъ различныхъ отдѣловъ