

идеть тяжь. Похотникъ длиной въ 5, а толщиной въ 2 снт., съ хорошо развитымъ praerutium и съ головкой, по нижней поверхности идетъ бороздка, оканчивающаяся отверстіемъ мочеиспускательнаго протока. Движеніе похотника кверху ограничены. Малыхъ губъ нѣтъ. Кзади отъ мочеиспускательнаго отверстія лежитъ отверстіе слѣпое (длиной въ 15 снт.) канала, не пропускающаго пальца. Двойное изслѣдованіе черезъ прямую кишку и брюшную стѣнку дало отрицательный результатъ.

Этой больной впослѣдствіи вслѣдствіе ущемленія грыжи было сдѣлано грыжесѣченіе, причемъ въ грыжевомъ мѣшкѣ оказалось тѣло, лежавшее въ толщѣ правой большой губы. Удаленное оно оказалось яичникомъ. Въ складкѣ брюшины оказалась фаллопиева труба.

Н. Какушкинъ.

59. Александровъ.—Изъ судебно-медицинской практики. Смерть отъ перитонита, послѣдовавшаго за раненіемъ матки.—Вѣстн. Общ. Гиг., Суд. и Практ. Мед., іюль, 1897 г., стр. 113).

Смерть произошла черезъ 15 дней послѣ полученныхъ боевъ. Вскрытіе показало, кромѣ обширныхъ поврежденій на головѣ и конечностяхъ, острый перитонитъ, развившійся, очевидно, вслѣдствіе проникающихъ ранъ матки, произведенныхъ, по мнѣнію автора какою либо нетолстой палкой (кнутовищемъ ?), съ силой вдвинутой во влагалище. Въ днѣ матки имѣлась сквозная рана, въ 2 снт. шириной, къ краямъ которой приросли петли тонкихъ кишекъ, выпавшія черезъ полость матки въ полость влагалища и ущемившіяся. Отверстіе шейки матки значительно расширено, благодаря боковому разрыву.

Н. Какушкинъ

60. И. Л. Кунигъ.—Къ вопросу о запоздаломъ выкидышѣ.—(Врачъ, 1897 г., № 24, стр. 678).

Описываются два случая: въ одномъ, у 33-лѣтней, многоорожавшей, 8-я беременность остановилась въ своемъ развитіи на пятомъ мѣсяцѣ, причемъ плодное яйцо, переродившись въ мясной заносъ, оставалось въ маткѣ 7 мѣсяцевъ, т. е. роды наступили на 11 мѣсяцѣ беременности, въ другомъ, у первобеременной 42 лѣтъ, плодъ умеръ въ концѣ 6-го мѣсяца беременности, но роды произошли въ концѣ 9 мѣсяца. Въ доступной автору литературѣ онъ собралъ съ 1835 г. по 1896 г. 27 случаевъ запоздалаго выкидыша (missed abortion) и дѣлаетъ слѣдующіе выводы. Возрастъ больныхъ въ среднемъ 31 годъ. Многоорожавшихъ было 88%. Въ 76,5% случаевъ имѣлись или разстройства об-