

63. В. Д. Вруслиловскій.—Воспоминанія о пребываніи въ академической акушерско-гинекологической клиникѣ И. Военно-медицинской академіи.—(Южно-Русск. Мед. Газета. 1887 г. №№ 28 и 29, с. 333 и 342).

Рѣчь идетъ о клиникѣ проф. А. И. Лебедева осенью 1896-го года. Авторъ описываетъ обстановку клиническихъ занятій, подробно останавливается на ходѣ чревосѣченія, главнымъ образомъ при оваріотоміи, и приводитъ, какъ образецъ, одинъ случай кесарскаго сѣченія, видѣнный имъ въ клиникѣ. Операнія произведена надъ первородящей, 18 лѣтъ, имѣвшей общесуженный тазъ (conj. diagonalis около 7½ сент.). Матка вскрыта по передней поверхности послѣ наложенія жгута. Ребенокъ извлеченъ въ асфиксіи и быстро оживленъ. На рану матки наложено 2 ряда швовъ (шелкъ): мышечные и брюшинные. Случай протекалъ вполне хорошо. Отзываясь очень тепло о клиникѣ проф. Лебедева, авторъ характеризуетъ взглядъ представителя этой клиники на хирургическое вмѣшательство въ области женскихъ болѣзней, какъ на вмѣшательство, строго взвѣшиваемое и имѣющее свои предѣлы.

Н. Какущинъ.

64. И. М. Львовъ.—Апоплексія праваго яичника, поведшая къ заматочной кровяной опухолѣ съ картиной разрыва трубы при внѣматочной беременности. Одновременное присутствіе pyosalpingis sinistri. Чревосѣченіе. Выздоровленіе при лѣченіи противуцѣпкожковой сывороткой.—(Врачъ. 1897 г. № 37, с. 1044).

Подъ словами apoplexia ovarii авторъ разумѣетъ не самостоятельную болѣзненную форму, а лишь припадокъ хроническаго межуточного возлѣмѣшечковаго воспаленія яичника, когда сильно гиперемированный и увеличенный органъ даетъ, въ случаѣ разрыва граафова пузырька, обильное кровоизліяніе и въ ткань яичника и въ полость брюшины. Въ статьѣ идетъ рѣчь о 26-лѣтней больной, рожавшей 4 раза и перенесшей послѣ послѣднихъ родовъ послѣродовое заболѣваніе, по выздоровленіи отъ котораго замѣчена опухоль внизу живота, слѣва. Двухмѣсячное отсутствіе кровей, внезапно появившееся кровотеченіе и схваткообразныя боли, при наличности заматочной кровяной опухоли и увеличеннаго праваго яичника, дали поводъ заподозрѣть здѣсь лопнувшую беременную трубу. При чревосѣченіи удалены изъ массы сращеній лѣвая, наполненная гноемъ, труба (лопнула при удаленіи), правые придатки и большое количество старыхъ кро-