

вяныхъ сгустковъ изъ заматочнаго пространства. Марлевый дренажъ чрезъ задній сводъ. Вырѣзанный личиниѣ оказался длиной въ 8, шириной въ 5 сант., содержалъ много кистовидныхъ граафовыхъ пузырьковъ и одну полость съ грецкѣй орѣхъ, наполненную кровяными сгустками и сообщавшуюся съ поверхностью личиника. Чрезъ 2 часа послѣ операціи больной выпрыснуто (ради предупрежденія гнилокрівія) 10 куб. сант. противуцѣпекковкой сыворотки. На 3-й день картина быстро развивающагося гниlostнаго зараженія (низкая t^0 , частый пульсъ, вздутый животъ, гнойнокровянистыя выдѣленія); удаленъ дренажъ и сдѣлано второе впрыскиваніе сыворотки. На 4-й день—помраченіе сознания, воючій поносъ; третье впрыскиваніе. Съ пятаго дня медленное поправленіе. Дѣйствіе сыворотки здѣсь авторъ признаетъ не вполне доказательнымъ, но онъ въ той-же статьѣ приводитъ описаніе случая послѣопераціоннаго гнилокрівія, гдѣ впрыскиваніе сыворотки оказало рѣзкій и благоприятный результатъ, каждый разъ понижая температуру тѣла и паразительно вліяя на разсаиваніе свѣжаго параметрическаго выпота. *Н. Какушкинъ.*

65. **М. И. Гошкевичъ.**—Изъ судебно-медицинской практики. Былъ-ли выкидышъ, явился-ли таковой естественно, или причиненъ искусственно, и отчего послѣдовала смерть?—(Вѣстн. Общ. Гиг., Суд. и Практ. Медиц. Июль 1897 г. стр. 116).

Дѣло имѣетъ болѣе судебный, нежели медицинскій интересъ. Въ одной изъ больницъ умерла больная при явленіяхъ *гнилокрівія* послѣ *повторно* произведеннаго ей въ больницѣ *выскабливанія*. Операція сдѣлана ей по поводу задержанія въ полости матки остатковъ плоднаго яйца (беременность 2—3 мѣсяцевъ). Гнилокрівіе развилось у нея уже въ больницѣ, послѣ выскабливанія, и признано причиной смерти. Былъ-ли въ этомъ случаѣ искусственный выкидышъ, или естественный, и какимъ образомъ онъ произошелъ, осталось невыясненнымъ. *Н. Какушкинъ.*

66. **Я. П. Шлапоберскій.**—Къ вопросу о гинекологическомъ употребленіи хлористаго цинка.—(Врачъ. 1897 г. № 37, стр. 1047).

Относительно удобопримѣимости и полезности хлористаго цинка въ гинекологіи существуютъ разные взгляды: одни гинекологи совершенно отвергаютъ это средство, другіе хвалятъ его. Разногласія, по мнѣнію автора, произошли отъ того, что вначалѣ

хлористый цинкъ примѣняли въ слишкомъ крѣпкихъ растворахъ (50%) и въ видѣ тѣста, т. е. въ такой формѣ, которая вызываетъ слишкомъ глубокія разрушенія тканей. Описаны случаи смерти отъ впрыскиванія въ матку 50% раствора безъ послѣдовательнаго промыванія полости и случаи полнаго заращенія шеечнаго канала послѣ приложенія тѣста. Къ предложенію *Hofmeier*'а вводить въ матку 10%—20% спиртные растворы карболовой кислоты авторъ также относится съ большимъ недоумѣніемъ, потому что его опытъ надъ самимъ собой со втираніемъ въ здоровую кожу 5% воднаго раствора карболовой кислоты давали симптомы общаго отравленія. Онъ примѣняетъ 20% растворъ хлористаго цинка въ формѣ смазываній (ватой на *Playfair*'овскомъ зондѣ) послѣ выскабливаній (при фунгозномъ эндометритѣ и при климактерическихъ кровопотеряхъ). Смазыванія повторяются чрезъ 5—6 дней послѣ предварительнаго промыванія полости матки 1/2% растворомъ лизоля. Блестящій результатъ авторъ получилъ отъ этого средства и при лѣченіи имъ ссадинъ шейки матки. *Н. Какушкинъ.*

67. **Г. Л. Ходаковскій.**—Способъ приобретенной гематометры.—(Дневн. Общ. врачей при И. Казанскомъ университетѣ. 1897 г. Вып. III, стр. 160).

Больная 29 лѣтъ, 5 лѣтъ назадъ родила, причѣмъ роды были очень продолжительны. Послѣ родовъ у больной образовался пузырно-влагалищный свищъ, причѣмъ для избавленія больной отъ недержанія мочи ей сдѣлана операція colprocleisis. Больная явилась въ казанскую клинику съ жалобой на сильныя схваткообразныя боли внизу живота, рѣзъ при мочеиспусканіи, напираніе на низъ. Въ маломъ тазу обнаружена опухоль, выступающая пальца на 2 надъ лономъ, представляющая растянутую кровью матку. При чревосѣченіи перевязаны и разсѣчены трубы и сосуды, питающіе верхній отдѣлъ матки. Помощью срединнаго разрѣза полость матки опорожнена. Отсѣченъ верхній отдѣлъ матки, а культя вшита въ брюшную рану и выполнена іодоформной марлей. Послѣоперационный періодъ протекалъ гладко. Недѣли чрезъ 3 каналъ второй культы въ верхней своей части очень сузился. Предположено съ цѣлью достиженія запусѣванія второго иѣшка подвергнуть его дѣйствию 100%-аго пара.

Н. Какушкинъ.