

44. **Dr. W. S. James. Prolonged gestation.** (New-York medical Journal, Sept. 15, 94, p. 343). **Продолжительная беременность.**

Д-ръ *James* наблюдалъ въ Cleveland'ѣ, въ Америкѣ, беременность, продолжавшуюся болѣе 10 мѣсяцевъ у 27-лѣтней женщины, при 5-й ея беременности. Послѣднія регулы были у ней 22-го апрѣля 1893 года, а 3-го февраля 1894 г. наступили родовыя схватки, признанныя ея акушеркою ложными болями; послѣднія дѣйствительно вскорѣ прекратились. Д-ръ *James*, приглашенный къ ней 24/II 1894 г., нашелъ шейку сглаженной при полномъ отсутствіи болей. Желая вызвать схватки, *J.* раздражалъ пальцами маточный зѣвъ, назначилъ хининъ; когда это оказалось безъ эффекта, *J.* далъ ей чайную ложку жидкаго экстракта спорыньи (около 12 gr. эрготина). Появились легкія сокращенія матки и околоплодный пузырь лопнулъ. Въ теченіи слѣдующаго дня *J.* производилъ черезъ каждыя 15 минутъ ротяженіе нижняго отрѣзка матки, схватокъ не было. Тогда *J.* наложилъ щипцы на высокостоящую головку и извлекъ безъ затрудненія дѣвочку, вѣсившую 10 фунтовъ. Мать и ребенокъ здоровы. *М. Гинзбургъ.*

45. **Dr. Tucker. Caesarean section. Obstruction overcam by Washing out Stomach.** (British med. Journ., 1894, 28/IV, p. 67) **Кесарское сѣченіе. Непроходимость кишекъ, излѣченная промываніемъ желудка.**

У беременной на сносяхъ карлицы, росту 4 футовъ 10 дюймовъ, съ conjug. extern. 5 дюймовъ, между сѣдалищными буграми 2 дюйма, роды окончены кесарскимъ сѣченіемъ. Ребенокъ 8 фунтовъ вѣсу, извлеченъ мнимоумершимъ и не былъ оживленъ. Черезъ 2 часа послѣ операціи у матери появилось вздутіе живота, страшныя боли, учащенный пульсъ и другіе припадки, указывавшіе на происшедшую непроходимость кишекъ. Д-ръ *Tucker* попробовалъ промываніе желудка, чѣмъ удалось устранить всѣ грозныя припадки.

М. Гинзбургъ.

46. **Dr. Bodilly. Puerperal Erythema simulating scarlat Fever.** (British med. Journ., 1894, 17/III). **Послѣродовая эритематозная сыпь, казавшаяся скарлатиной.**

У женщины, разрѣшившейся отъ 2-й беременности, на 4 день послѣ нормальныхъ родовъ, появился жаръ и красная сыпь на ногахъ и животѣ, похожая на скарлатинную. На слѣдующее утро сыпь распространилась по всему тѣлу. Но прекрасное самочувствіе больной, пониженіе температуры до нормы, правильность послѣ-