

чается правильнымъ появленіемъ регулъ; параметральный абсцессъ вскрылся бы скорѣе во влагалище. Такимъ образомъ авторъ останавливается на haematocoele. Относительно способовъ лѣченія такого гнойника, д-ръ *Cribb* указываетъ, что у *Lawson Tait*'а изъ 88 лапоротомій, произведенныхъ по этому поводу, всѣ выздоровѣли; а изъ 19 случаевъ *Savage*'а, пользованныхъ выщипаніемъ гноя аспираціоннымъ троакаромъ или предоставленныхъ самопроизвольному вскрытію, 5 окончились летально.

М. Гинзбургъ.

52. **D-r Way.** (Adelaide, въ Австраліи). **Ectopic gestation, ruptured left Fallopian tube, haemato-salpinx of the right tube of same patient.** (The Australasian medical Gazette, 1894, IX, p. 299). **Внѣматочная беременность, разрывъ лѣвой Фаллопіевой трубы и кровоизліяніе въ правой трубѣ.**

У молодой женщины, считавшей себя беременной, появились крови и боли съ 5 недѣли беременности и продолжались шесть недѣль. Принята въ больницу ради операціи. Въ лѣвой части таза замѣчалась эластическая опухоль, величиною съ апельсинъ, смѣстившая матку вправо, а позади матки occupied растянута труба. Во время анестезіи дыханіе больной вдругъ стало поверхностнымъ и пульсъ ослабѣлъ, больная поблѣднѣла. Вскрытіе живота показало огромное свѣжее кровоизліяніе изъ разорвавшейся беременной трубы; быстрой перевязкой трубы кровотеченіе остановлено. Операція выяснила, что кромѣ этого свѣжаго разрыва, въ трубѣ замѣчался старый разрывъ ея съ кровоизліяніемъ въ широкую связку; а труба другой стороны (правая) была тоже растянута кровянистымъ содержимымъ. Зародышъ найденъ въ полости живота. Оперированная выздоровѣла.

М. Гинзбургъ.

53. **D-r Strand.** **Submucous Fibromyoma together with tubovarian disease mistaken for multiple fibroids of the uterus; hysterectomy; recovery.** (The American Journ. of Obstetrics etc., 1894, I, p. 112). **Подслизистая фиброміома съ измѣненіями придатковъ матки, принятая по ошибкѣ за множественные интерстиціальныя фиброиды. Операція, окончившаяся выздоровленіемъ.**

D-ръ *Strand* и двое другихъ извѣстныхъ въ Нью-Йоркѣ гинекологовъ изслѣдовали дѣвственницу и всѣ трое сдѣлали ту же ошибку, не узнавши торчавшей изъ тонкой маточной шейки

опухли и не отыскавъ маточнаго зѣва. При лапоротоміи дѣло выяснилось. Кромѣ опухоли, исходившей изъ матки, яичники и трубы, оказались болѣзненно-измѣненными и потому были удалены вмѣстѣ съ маткою, истонченная шейка которой оставлена вмѣсто культи. Вскрытіе вырѣзанной матки указало, что болѣзненные придатки были приняты за множественные фиброиды, а въ маткѣ вмѣсто нѣсколькихъ простѣночныхъ былъ одинъ подслизистый фиброидъ. Оперированная выздоровѣла.

М. Гинзбургъ.