

мендованнаго авторомъ комбинируваннаго способа, т. е., лишь при одновременномъ дѣйствіи внутренними манипуляціями на головку и наружными на туловище, можно ожидать успѣха отъ попытки превращенія. Показывается эта операція всякій разъ, когда роды въ концѣ перваго и во второмъ періодѣ, вслѣдствіе слабости потугъ, затягиваются и предвидится серьезная опасность для жизни плода. Необходимыми условіями для производства операціи, являются достаточная подвижность плода и такое раскрытіе зѣва, которое пропускало бы полруки. Противупоказуется превращеніе, при такъ называемыхъ первичныхъ лицевыхъ положеніяхъ, т. е. такихъ, которыя образовались уже задолго до родовъ, при выпаденіи пупочнаго канатика, при предлежаніи дѣтскаго мѣста, при спазмотическомъ сокращеніи шейки, при сильномъ растяженіи нижняго отрѣзка матки и при болѣе высокихъ степеняхъ суженія таза. Превращеніе же лобныхъ положеній въ затылочные, рекомендуется также и съ профилактическою цѣлью. (Подробное описаніе операціи превращенія лицевыхъ положеній въ затылочные, читатель найдетъ въ этомъ же журналѣ, за 1887 годъ, стр. 220). *С. Ю. Хазанъ.*

61. Холмогоровъ. Zur Behandlung der Completen Uterus rupturen. (Zeitsch. f. Geb. und Gyn., Bd. XXXI, Hft. 1). Къ лѣченію полныхъ разрывовъ матки.

Сдѣлавъ критическую оцѣнку различныхъ способовъ лѣченія разрыва матки, авторъ приходитъ къ тому заключенію, что самый рациональный способъ, это зашиваніе разрыва черезъ влагалище, съ оставленіемъ небольшого отверстія, черезъ которое въ брюшную полость вводится дренажъ изъ іодоформенной марли. Будучи примѣненнымъ въ одномъ случаѣ, методъ этотъ далъ прекрасный результатъ. *С. Ю. Хазанъ.*