

образомъ впервые доказать возможность перехода у человѣка виновниковъ разбираемой болѣзни отъ матери къ плоду. При этомъ достойно вниманія то, что и количество встрѣчаемыхъ у плода палочекъ меньше и количество ихъ другое, чѣмъ у матери, обстоятельство, указывающее на то, что микробы при прохожденіи своемъ черезъ плаценту отчасти встрѣчаютъ плохія условія для своего размноженія, отчасти совершенно погибаютъ. Какъ на одну изъ возможныхъ причинъ этого явленія авторъ указываетъ на извѣстное свойство крови пріобрѣтать во время болѣзни микробоубивающее дѣйствіе. Авторъ именно склоненъ думать, что когда микробы достигаютъ плаценты, кровь плода уже настолько успѣла измѣниться, что попадающіе туда микробы встрѣчаютъ препятствія для своего развитія. Сопоставляя въ заключеніе упомянутые три случая сибирской язвы, окончившихся летально, съ тремя случаями той-же болѣзни, наблюдавшимися одновременно у небеременныхъ и окончившимися выздоровленіемъ, авторъ указываетъ на несомнѣнно плохой прогнозъ этого страданія у беременных

С. Ю. Хазанъ.

б) А н г л і й с к о й.

130. 1. Prof. Murray (Edinburgh).—Forceps with adjustable axis-Traction.—(Edinburgh med. Journal, Septemb., 1896, p. 229).—Осевые щипцы съ передвижнымъ аппаратомъ для влеченія.

2. Dr. Owen Mackness (Edinburgh).—Some Modification of Midwifery Forceps.—(Ibidem p. 237).—Новыя измѣненія акушерскихъ щипцовъ.

3. Dr. Schultz.—Version or high Forceps.—(Americ J. of Obst etc, 1896, X, p. 586).—Поворотъ или высокіе щипцы.

I. Щипцы *Murray*'я—видоизмѣненіе особыхъ щипцовъ *Tarnier—Simpson*'а Въ нихъ прутики для влеченія, начинаясь у самыхъ оконъ щипцевыхъ ложекъ, идутъ вдоль рукоятки, потомъ направляются подъ прямымъ угломъ книзу на $4\frac{1}{2}$ дюйма; блокъ посредствомъ особаго винта можетъ прикрѣпляться къ любой точкѣ этой части прутиковъ, на которой черезъ каждыя $\frac{1}{2}$ " отмѣчены цифры отъ 0 до 7. Къ блоку прикрѣпляются ручки на шарнирѣ, допускающемъ ихъ передвиженіе въ параллельномъ прутикамъ направленіи съ цѣлю перемѣщенія ручекъ при тракціяхъ, соотвѣтственно положенію прутиковъ влеченія. На мѣстѣ соединенія послѣднихъ съ блокомъ находится стрѣлка, а на блокѣ—дугообразная линія точекъ съ отмѣткою на ея серединѣ „Nor-