

чинается по направленію отъ верхушки къ основанію, на одной или обѣихъ сторонахъ, оставляя въ срединѣ только цилиндрическую часть съ прилегающими къ ней обломками, Эти измѣненія фосфатовъ мочи становятся замѣтными, начиная съ 20-го дня отъ зачатія, выступаютъ рѣзче въ первые мѣсяцы беременности, а въ послѣдніе мѣсяцы ея ихъ опять незамѣтно. Въ случаѣ смерти зародыша моча теряетъ эту особенность.

(Тизоновская жидкость состоитъ изъ *magnes. sulphuricae, ammonii muriatic, aq ammoniat. aa part; aq dest. partes VIII*).

М. Гинзбургъ.

135. **Dr. Godson**, директоръ *Lying in Hospital to the City of London.—Antiseptic Midwifery.*—(*Lancet'* 1897 23 January, p. 222).—**Антисептика въ акушерствѣ.**

Въ виду перехода б. ч. врачей отъ антисептики къ асептикѣ интересны приводимые *Godson'*омъ факты и мнѣнія его въ пользу сулемы. *Godson* завѣдуетъ родильн. домомъ, основанномъ въ 1771 году, т. е. 124 года назадъ. *G.* приводитъ регистрацію смертности въ немъ съ 1833 г., а именно:

Съ 1833 до 1860 г. изъ 5833 родильницъ умерли 180 или	3%	или 1 изъ 31½
„ 1861 — 1877 г. „ 3773 „ „ 64 „	1.69%	„ 1 „ 58½

Въ теченіи семидесятихъ годовъ, когда смертность временами повышалась выше 5% (1 изъ 19), госпиталь закрывали и обновляли въ немъ все: штукатурку, кровати и т. д., что стоило десятки тысячъ р. (10,000 ф. ст.) и улучшало дѣло не на долго. Въ ту пору смертность въ 1% считалась благоприятной: ею могли похвалиться лучшіе изъ госпиталей; такую же она была и въ частной практикѣ. У знаменитаго *Mathew Duncan'a* въ 1870 г. изъ 736 родильницъ его частной практикѣ умерли 8 или 1 изъ 92.

Съ 1877 г. начали примѣнять антисептику, сначала карболовую кислоту, потомъ *kalı hypermanganicum*, затѣмъ съ 1886 г. сулему. При послѣдней смертность стояла ниже, чѣмъ при первыхъ двухъ, такъ:

Съ 1880—1887 изъ 2585 родильницъ умерло 16 или	0,619%	или 1 изъ 161½
„ 1886—1896 „ 2392 „ „ 3 „	0,125%	„ 1 „ 797

и ни одной септицеміи. *Godson* назначаетъ сулему обыкнов. крѣпости (1:2000) и ни разу не наблюдалъ отравленія ею.

По поводу благотѣльнаго вліянія антисептики *Godson* закончилъ свою президентскую рѣчь слѣдующимъ изрѣченіемъ: многихъ военныхъ начальниковъ возвели въ Англіи въ перы за разрушеніе жизни людей; но никто не заслужилъ этой чести

болѣе *Lister'a*, возведеннаго въ перы за войну съ госпитальной инфекціей, спасающаго своимъ открытіемъ ежегодно многія тысячи жизней.

М. Гинзбургъ.

136. *R. Leeson* (St. Thomas Hospital, Edinburgh).—**Two Cases of Paraplegia after Parturition.**—(Edinburgh medic. Journal, 1897, april, p. 411).—**Два случая параплегии послѣ родовъ.**

Чрезвычайная рѣдкость подобныхъ заболѣваній доказывается будто уже тѣмъ, что авторъ ничего не нашелъ о нихъ въ англійскихъ учебникахъ.

Въ 1-мъ случаѣ параплегія развилась у 24-хъ лѣтней женщины, послѣ ея 3-хъ родовъ; послѣдніе были окончены ручнымъ отдѣленіемъ приросшаго мѣста, произведеннаго безъ насилія и съ послѣдующимъ промываніемъ матки. Болѣзнь замѣчена черезъ 36 часовъ послѣ родовъ: ноги лежали въ экстензіи въ мышцахъ ощущалось окоченѣніе, только въ пяткѣ сохранилась нѣкоторая подвижность.

Всѣ другія отправления организма были нормальны. Диагнозъ *parapl. hysterica* на томъ основаніи, что напряженность въ мышцахъ не была постоянной и по временамъ возстановливалось движеніе въ той или другой группѣ мышцъ. На 10-й день параплегии начала проходить, а къ 18-му дню совершенно прошла.

Изъ анамнеза слѣдуетъ отмѣтить бывшую въ дѣтствѣ тяжелую хорею съ параличемъ ногъ 5-и мѣсячной длительности.

Другой случай у 1 роженицы, гдѣ тоже потребовалось ручное отдѣленіе послѣда, протекалъ еще легче: параплегія, начавшаяся тотчасъ послѣ родовъ, стала улучшаться на 3-й день послѣ нихъ, а къ концу недѣли прошла; тутъ не было напряженности въ мышцахъ, истерія была и у этой дамы.

Примѣчаніе. Реф. описалъ (Медиц. Обозр. 1882. Отчетъ по Операт. акушерству за три года) случай гимиплегіи съ параличемъ глотательныхъ мышцъ, происшедшій послѣ родовъ, осложнившихся эклампсией. Выздоровленіе на 3-ей недѣлѣ. Рефферентъ и др. врачи признали параличи *истерическими*.

М. Гинзбургъ.

137. *Dr. Dalziel.*—**Congenital absence of the rectum in a child three and a half days old.**—(The Edinburgh medical Journal, february 1897, p. 231).—**Врожденное отсутствіе прямой кишки у ребенка 3½ дневнаго возраста.**

Авторъ, желая дать искусственный выходъ фекальнымъ массамъ, вскрылъ животикъ ребенка на лѣвой подвздошной сторонѣ. Такъ какъ *fl. sigmoidea* оказалась смѣщенной вправо, то *D.*, за-