

болѣе *Lister'a*, возведеннаго въ перы за войну съ госпитальной инфекціей, спасающаго своимъ открытиемъ ежегодно многія тысячи жизней.

M. Гинзбургъ.

136. R. Leeson (St. Thomas Hospital, Edinburgh).—**Two Cases of Paraplegia after Parturition.**—(Edinburgh medic. Journal, 1897, april, p. 411).—Два случая параплегії послѣ родовъ.

Чрезвычайная рѣдкость подобныхъ заболѣваний доказывается будто уже тѣмъ, что авторъ ничего не нашелъ о нихъ въ англійскихъ учебникахъ.

Въ 1-мъ случаѣ параплегія развилась у 24-хъ лѣтней женщины, послѣ ея 3-хъ родовъ; послѣдніе были окончены ручнымъ отдѣленіемъ приросшаго мѣста, произведенаго безъ насилия и съ послѣдующимъ промываніемъ матки. Больѣнь замѣчена че-резъ 36 часовъ послѣ родовъ: ноги лежали въ экстензіи въ мышцахъ ощущалось окоченѣніе, только въ пяткѣ сохранилась нѣкоторая подвижность.

Всѣ другія отправленія организма были нормальны. Диагнозъ parapl. hysteria на томъ основаніи, что напряженность въ мышцахъ не была постоянной и по временамъ возстанавливалась движение въ той или другой группѣ мышцъ. На 10-й день параплегія начала проходить, а къ 18-му дню совершенно прошла.

Изъ анамнеза слѣдуетъ отмѣтить бывшую въ дѣствѣ тяжелую хорею съ параличемъ ногъ 5-и мѣсячной длительности.

Другой случай у 1 роженицы, гдѣ тоже потребовалось ручное отдѣленіе послѣда, протекалъ еще легче: параплегія, начавшаяся тотчасъ послѣ родовъ, стала улучшаться на 3-й день послѣ нихъ, а къ концу недѣли прошла; тутъ не было напряженности въ мышцахъ, истерія была и у этой дамы.

Примѣчаніе. Реф. описалъ (Медиц. Обозр. 1882. Отчетъ по Операт. акушерству за три года) случай гимиплегії съ параличемъ глотательныхъ мышцъ, происшедший послѣ родовъ, осложнившихся эклампсіей. Выздоровленіе на 3-ей недѣлѣ. Рефферентъ и др. врачи признали параличи *истерическими*.

M. Гинзбургъ.

137. Dr. Dalziel.—**Congenital absence of the rectum in a child three and a half days old.**—(The Edinburgh medical Journal, february 1897, p. 231).—**Врожденное отсутствие прямой кишки у ребенка 3½ дневного возраста.**

Авторъ, желая дать искусственный выходъ фекальнымъ мас-самъ, вскрылъ животикъ ребенка на лѣвой подвздошной сторонѣ. Такъ какъ fl. sigmoidca оказалась смѣщенной вправо, то D., за-