

болѣе *Lister'a*, возведеннаго въ перы за войну съ госпитальной инфекціей, спасающаго своимъ открытіемъ ежегодно многія тысячи жизней.

М. Гинзбургъ.

136. R. Leeson (St. Thomas Hospital, Edinburgh).—**Two Cases of Paraplegia after Parturition.**—(Edinburgh medic. Journal, 1897, april, p. 411).—**Два случая параплегии послѣ родовъ.**

Чрезвычайная рѣдкость подобныхъ заболѣваній доказывается будто уже тѣмъ, что авторъ ничего не нашелъ о нихъ въ англійскихъ учебникахъ.

Въ 1-мъ случаѣ параплегія развилась у 24-хъ лѣтней женщины, послѣ ея 3-хъ родовъ; послѣдніе были окончены ручнымъ отдѣленіемъ приросшаго мѣста, произведеннаго безъ насилія и съ послѣдующимъ промываніемъ матки. Болѣзнь замѣчена черезъ 36 часовъ послѣ родовъ: ноги лежали въ экстензіи въ мышцахъ ощущалось окоченѣніе, только въ пяткѣ сохранилась нѣкоторая подвижность.

Всѣ другія отправления организма были нормальны. Диагнозъ *parapl. hysterica* на томъ основаніи, что напряженность въ мышцахъ не была постоянной и по временамъ возстановлялось движеніе въ той или другой группѣ мышцъ. На 10-й день параплегии начала проходить, а къ 18-му дню совершенно прошла.

Изъ анамнеза слѣдуетъ отмѣтить бывшую въ дѣтствѣ тяжелую хорею съ параличемъ ногъ 5-и мѣсячной длительности.

Другой случай у 1 роженицы, гдѣ тоже потребовалось ручное отдѣленіе послѣда, протекалъ еще легче: параплегія, начавшаяся тотчасъ послѣ родовъ, стала улучшаться на 3-й день послѣ нихъ, а къ концу недѣли прошла; тутъ не было напряженности въ мышцахъ, истерія была и у этой дамы.

Примѣчаніе. Реф. описалъ (Медиц. Обозр. 1882. Отчетъ по Операт. акушерству за три года) случай гимиплегіи съ параличемъ глотательныхъ мышцъ, происшедшій послѣ родовъ, осложнившихся эклампсией. Выздоровленіе на 3-ей недѣлѣ. Рефферентъ и др. врачи признали параличи *истерическими*.

М. Гинзбургъ.

137. Dr. Dalziel.—**Congenital absence of the rectum in a child three and a half days old.**—(The Edinburgh medical Journal, february 1897, p. 231).—**Врожденное отсутствіе прямой кишки у ребенка 3½ дневнаго возраста.**

Авторъ, желая дать искусственный выходъ фекальнымъ массамъ, вскрылъ животикъ ребенка на лѣвой подвздошной сторонѣ. Такъ какъ fl. sigmoidea оказалась смѣщенной вправо, то *D.*, за-

шивъ первый разръзъ, вскрылъ животикъ на правой сторонѣ, ввелъ въ кишку стеклянную дренажную трубку и зашилъ рану. Все шло хорошо до 7 дня; потомъ появилось повышеніе температуры и гной въ мочѣ; ребенокъ умеръ на 14-й день. Вскрытіе указало причину смерти: пузырно-ректальную фистулу, и нагноеніе въ обѣихъ почкахъ, обусловленное *Bacillo coli commune*.

М. Гинзбургъ.

138. 1. Prof. Barton Cooke Hirst. (Philadelphia).—Cases of puerperal Sepsis in wich the Antistreptococcic Serum was employed.—(The American Journ. of Obstetrics etc. 1897, May, p. 625).—Случай родильной горячки съ примѣненіемъ антистрептококковой сыворотки.

2. Prof. R. Norris (Pennsylvania).—A Case of Puerperal Sepsis successfully treated with Antistreptococcic Serum.—(Ibidem, p. 629).—Родильная горячка, излѣченная противу-стрепток. сывороткой.

3. Dr. Davis (Philadelphia).—A marked Result in the Treatment of Puerperal Sepsis obtained by the Use of Serum; also Two Failures of the same Method of Treatment. — (Ibidem. p. 624).—Очевидная польза лѣченія родильной горячки сывороткою: 2 случая безуспѣшнаго примѣненія этого способа.

4. Prof. Baldy (Philadelphia).—Antistreptococcic Serum in a Case of Acute Puerperal Lymphangitis and phlebitis.—(Ibidem, p. 645).—Противустрептококковая сыворотка въ одномъ случаѣ остраго родильнаго лимфангита (смерть послѣ примѣненія ея).

1. Септический послѣродовой флебитъ съ общимъ зараженіемъ крови. При полномъ отсутствіи мѣстныхъизмѣненій въ тазу, родильница болѣе мѣсяца страдала высокою лихорадкой, доведшей ее до сильнаго истощенія. Проф. *Hirst* назначилъ ей; впрыскиванія антистрептококовой сыворотки *Marmorek'a* по 10 куб. сантим. ежедневно, 3 дня сряду. Никакого улучшенія не наступило; 5 дней послѣ 3-го впрыскиванія *Hirst* назначилъ больной *nuclein* (форма и доза непоказаны, вѣроятно подкожно, (реф)). Благодаря ли нуклеину или случайности, но больная стала поправляться. Въ другомъ случаѣ у родильницы было thrombo-phlebitis, впрыскиваніе сыворотки *Marmorek'a* начато поздно и больная умерла. Въ третьемъ случаѣ у беременной съ нефритомъ (вся моча при кипяченіи свертывалась) произведено кесарское сѣченіе съ ампутаціей матки; черезъ 2—3 дня въ цервикальной культѣ