

шивъ первый разръзъ, вскрылъ животикъ на правой сторонѣ, ввелъ въ кишку стеклянную дренажную трубку и зашилъ рану. Все шло хорошо до 7 дня; потомъ появилось повышеніе температуры и гной въ мочѣ; ребенокъ умеръ на 14-й день. Вскрытіе указало причину смерти: пузырно-ректальную фистулу, и нагноеніе въ обѣихъ почкахъ, обусловленное *Bacillo coli commune*.

*М. Гинзбургъ.*

138. 1. Prof. Barton Cooke Hirst. (Philadelphia).—Cases of puerperal Sepsis in wich the Antistreptococcic Serum was employed.—(The American Journ. of Obstetrics etc. 1897, May, p. 625).—Случай родильной горячки съ примѣненіемъ антистрептококковой сыворотки.

2. Prof. R. Norris (Pennsylvania).—A Case of Puerperal Sepsis successfully treated with Antistreptococcic Serum.—(Ibidem, p. 629).—Родильная горячка, излѣченная противу-стрепток. сывороткой.

3. Dr. Davis (Philadelphia).—A marked Result in the Treatment of Puerperal Sepsis obtained by the Use of Serum; also Two Failures of the same Method of Treatment. —(Ibidem, p. 624).—Очевидная польза лѣченія родильной горячки сывороткою: 2 случая безуспѣшнаго примѣненія этого способа.

4. Prof. Baldy (Philadelphia).—Antistreptococcic Serum in a Case of Acute Puerperal Lymphangitis and phlebitis.—(Ibidem, p. 645).—Противустрептококковая сыворотка въ одномъ случаѣ остраго родильнаго лимфангита (смерть послѣ примѣненія ея).

1. Септический послѣродовой флебитъ съ общимъ зараженіемъ крови. При полномъ отсутствіи мѣстныхъизмѣненій въ тазу, родильница болѣе мѣсяца страдала высокою лихорадкой, доведшей ее до сильнаго истощенія. Проф. *Hirst* назначилъ ей; впрыскиванія антистрептококовой сыворотки *Marmorek'a* по 10 куб. сантим. ежедневно, 3 дня сряду. Никакого улучшенія не наступило; 5 дней послѣ 3-го впрыскиванія *Hirst* назначилъ больной *nuclein* (форма и доза непоказаны, вѣроятно подкожно, (реф)). Благодаря ли нуклеину или случайности, но больная стала поправляться. Въ другомъ случаѣ у родильницы было thrombo-phlebitis, впрыскиваніе сыворотки *Marmorek'a* начато поздно и больная умерла. Въ третьемъ случаѣ у беременной съ нефритомъ (вся моча при кипяченіи свертывалась) произведено кесарское сѣченіе съ ампутаціей матки; черезъ 2—3 дня въ цервикальной культѣ