

б) Н ѣ м е ц к о й.

108. **Adolf Gessner.**—**Zwei Fälle von Spontaner Uterusruptur.** (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 2). **Два случая произвольнаго разрыва матки.**

1) У 35-лѣтней, многородящей, съ правильнымъ тазомъ, распознано поперечное положеніе плода, выпаденіе ручки и пуповины. Во время наркотизаціи и дезинфекціи половыхъ частей, обнаруженъ лѣвосторонній разрывъ матки и верхняго отрѣзка влагалища, съ выхожденіемъ головки плода въ брюшную полость. Поворотъ и извлеченіе ребенка (2600 грм., 48 снтм.) въ асфиксіи, скоро оживленнаго. Послѣдъ удаленъ легко. Разрывъ затампонированъ. Скоро обнаружались явленія внутренняго кровотеченія со всѣми явленіями остраго малокровія. Чревосѣченіе. Въ лѣвой широкой связкѣ оказалась большая гематома; продолжающагося кровотеченія нѣтъ. Брюшная рана зашита. Больная поправилась.

2) 22-лѣтняя, второродящая. Косое положеніе головки, пораженной водянкой (hydrocephalus). Правосторонній разрывъ матки. Прободеніе головки съ извлеченіемъ плода и удаленіе послѣда. Введенная рука обнаружила, что разрывъ не проникаетъ черезъ брюшину. Тампонація. Въ послѣродовомъ періодѣ въ области разрыва получилась гематома; пузырно-шеечный свищъ. Выздоровленіе. Разсуждая по поводу этихъ случаевъ, авторъ указываетъ на чувствительность живота, какъ на патогномоническій признакъ разрыва матки.

Н. Какущкинъ.

109. **Reusing.**—**Ein Fall traumatischer Uterusruptur in der Schwangerschaft.** (Centralbl. f. Gynaek., 1895 г., № 2). **Случай травматическаго разрыва матки во время беременности.**

Первобеременная, 23 лѣтъ, на 8 мѣсяцѣ беременности, будучи вполне здоровой, упала съ высоты 4 метровъ на ноги. Потомъ при посторонней помощи могла идти нѣсколько шаговъ. Симптомы: боль въ животѣ и отхожденіе водъ. Другихъ явленій никакихъ. Объективное изслѣдованіе показало разрывъ матки съ выхожденіемъ плода въ брюшную полость. Чревосѣченіе обнаружило, что разрывъ шелъ по передней поверхности матки, продольно, въ области дна и тѣла. Плодъ лежалъ свободно въ брюшной полости, а послѣдъ въ разрывѣ. Послѣ освобожденія и очистки полости

матки и брюшины, освѣжены края разрыва матки и шиты шелковыми швами. Полость матки дренирована черезъ влагалище. Брюшная полость зашита. Дренажъ удаленъ на шестой день. Больная выздоровѣла. Авторъ приводитъ еще три случая травматическаго разрыва во время беременности, добытые имъ изъ литературы, и говоритъ, что такой разрывъ возможенъ и при отсутствіи какого-либо предрасположенія маточной стѣнки къ разрыву. Механизмъ такого разрыва сводится къ дѣйствию не прямого противу удара, какъ это бываетъ при разрывѣ мочевого пузыря и другихъ половыхъ органовъ въ полости живота. Отсутствіе какихъ либо общихъ явленій при разрывѣ въ описанномъ случаѣ, авторъ объясняетъ отсутствіемъ инфекции, которая, по мнѣнію *Winkel*'я, играетъ первенствующую роль въ развитіи такихъ явленій.

Н. Какушкинъ.

110. **O. Schlaepfer.**—**Fall von künstlicher Frühgeburt nach früher überstandenen Kaiserschnitt.** (Centralbl. f. Gynaek., 1895 г., № 6). **Случай искусственныхъ преждевременныхъ родовъ послѣ бывшаго ранѣ кесарскаго сѣченія.**

У 27-лѣтней женщины, съ плоскимъ тазомъ, во время родовъ, сдѣлано кесарское сѣченіе на мертвомъ плодѣ (не было инструментовъ для перфораци и извлеченія). При этомъ слизистая оболочка матки прижжена растворомъ хлористаго цинка. Черезъ 2 года вторая беременность, правильно протекавшая. Въ концѣ 9-го мѣсяца сдѣланы искусственные роды и полученъ живой плодъ. Послѣ родовъ ясно прощупывался черезъ брюшные покровы рубецъ на передней стѣнкѣ матки. Во время беременности и во время родовъ, этотъ рубецъ не ощущался. *Н. Какушкинъ.*

111. **Beaucamp.**—**Recidiv von Osteomalakie nach Porro.** (Centralbl. für Gynaekol., 1895 г., № 6). **Возвратъ остеомаляціи послѣ операціи Porro.**

Первыя двѣ беременности протекли правильно. Во время третьей, также окончившейся правильно, появились первые признаки остеомаляціи. Четвертая (черезъ годъ послѣ третьей), окончена извлеченіемъ плода, а пятая (черезъ 2 года послѣ предыдущей), операціей Porro. Эффектъ операціи (остановка остеомалятическаго процесса), держался 2 года, а затѣмъ началось прогрессируваніе всѣхъ симптомовъ. Ни фосфоръ, ни холодная вода не давали улучшеній; послѣднія отчасти достигались примѣненіемъ теплыхъ ваннъ и обертываній. Авторъ назначилъ больной хло-