

раль-гидратъ, который произвелъ благопріятное дѣйствіе на боли, походка же осталась безъ переменъ. Авторъ, между прочимъ, описываетъ другой случай остеомалации (безъ кастраціи), гдѣ хлораль-гидратъ дѣйствовалъ хорошо не только на боли, но и на способность передвигаться. Впрочемъ, и дѣйствія этого средства были не постоянны.

Н. Какушкинъ.

112. Lennander.—Myom des Uteruskörpers mit Trennung des Cervix vom Körper. (Centralbl. f. Gynaek., 1895 г., № 6).

Virgo intacta, 49 л., въ климактерическомъ періодѣ. Впервые замѣтила опухоль у себя, будучи лѣтъ 35. Опухоль занимаетъ преимущественно лѣвую половину живота, достигая по сосковой линіи до реберъ, по средней линіи до 8 снтм. надъ пупкомъ. Зондъ вводится въ каналъ матки лишь на 4 снтм. Чревосѣченіе съ удаленіемъ опухоли, матки и придатковъ (больная умерла отъ перитонита, вслѣдствіе перитифлитического нарыва). Оказалось, что каналы собственно матки и шейки вполне изолированы другъ отъ друга: полость матки представляетъ замкнутый мѣшокъ, полость шейки—слѣпой мѣшокъ, закрытый со стороны тѣла матки толстой, фиброзной тканью. Опухоль исходитъ изъ средне-верхней стѣнки матки. Мускулатура матки атрофирована. Въ литературѣ описано лишь нѣсколько подобныхъ случаевъ.

Н. Какушкинъ.

**113. I. Neumann.—Ueber das Verhalten der Patellarreflexe beim Schwangeren Weibe. (Centralbl. f. Gynaek., 1895 г., № 8).
О пателлярномъ рефлексѣ у беременныхъ женщинъ.**

Въ послѣдніе мѣсяцы беременности авторъ у многихъ беременныхъ находилъ пателлярные рефлексъ повышенными, тѣмъ болѣе, чѣмъ ближе была беременность къ наступленію родовъ. Однако въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при самомъ наступленіи родовъ рефлексъ были въ предѣлахъ нормы. Это заставляетъ автора допустить здѣсь вліяніе индивидуальности и душевнаго состоянія беременной; меньшее значеніе имѣютъ возрастъ, число предшествовавшихъ беременностей, положеніе плода и отношеніе предлежащей части къ тазу. У роженицъ при сильныхъ схваткахъ рефлексъ оказывались повышенными и только въ рѣдкихъ случаяхъ, при затянувшихся родахъ, при раннемъ отхожденіи водъ, этого повышенія не наблюдалось. Повышеніе рефлексовъ шло постепенно и достигало высшей точки въ періодъ изгнанія плода. Повышеніе пателлярныхъ рефлексовъ авторъ ставитъ въ связь