

съ родовой дѣятельностью, особенно въ періодъ раскрытія зѣва, когда прочіе рефлексы наклонности къ повышенію не обнаруживаютъ. Послѣдніе начинаютъ повышаться въ дальнѣйшемъ теченіи родовъ. Въ послѣродовомъ періодѣ рефлексы постепенно, въ течение 2—3 дней, приходятъ къ нормѣ. Имѣя въ виду, что центры сокращающей дѣятельности матки и рефлексовъ находятся, вѣроятно, въ мозгу по сосѣдству или въ одномъ мѣстѣ, авторъ объясняетъ этимъ связь родовой дѣятельности съ колебаніями рефлексовъ. Самый же фактъ повышенія рефлексовъ находитъ себѣ объясненіе въ повышенной раздражительности, въ которой находится центральная нервная система у беременныхъ, особенно въ періодъ родовъ.

*Н. Какучкинъ.*

114. Nijhoff.—Ein neues Verfahren zur Behandlung der Placenta praevia centralis. (Centralbl. f. Gynaek., 1895 г., № 8). **Новый способъ веденія родовъ при центральномъ предлежаніи послѣда.**

Въ концѣ беременности, при кровотеченіи, когда зѣвъ еще не пропускалъ пальца, авторъ сдѣлалъ тампонацію шейки и влагалища. Зѣвъ открылся на 2 пальца, кровотеченіе продолжалось. Тогда авторъ сдѣлалъ разрывъ (линейный) въ предлежащей части послѣда, не нарушивъ цѣлости водной оболочки. Послѣдняя, напрягаясь подъ вліяніемъ схватокъ, дѣйствовала на дальнѣйшее расширеніе зѣва. Кровотеченіе сдѣлалось незначительнымъ, и роды постепенно дошли до конца. Ребенокъ (головное предлежаніе) родился живымъ. Послѣдъ выдѣлился произвольно. Онъ имѣлъ почти посрединѣ разрывъ, илуцій отъ одного края, но недоходящій до противоположнаго. Пуповина оказалась прикрѣпленною къ одной изъ половинъ дѣтскаго мѣста. Ребенокъ вышелъ, слѣдовательно, чрезъ означенный разрывъ. Авторъ совѣтуетъ всегда при центральномъ предлежаніи послѣда дѣлать подобное отверстіе въ послѣдѣ и, если оболочки окажутся также вскрытыми, оканчивать роды быстро поворотомъ и извлеченіемъ.

*Н. Какучкинъ.*

115. А. Пальховскій.—Ein Fall von Placenta praevia bei Zwillingen. (Centralbl. f. Gynaek., 1895 г., № 8). **Случай предлежанія послѣда при двойняхъ.**

Большая, 30 лѣтъ, беременна въ 8-й разъ. Срочные роды. Распознано краевое предлежаніе послѣда (кровотеченіе) и двойни. При зѣвѣ на 5 пальцевъ сдѣланъ поворотъ и извлеченіе перваго плода (головное предлежаніе), а затѣмъ—второго (поперечное