

съ родовой дѣятельностью, особенно въ періодъ раскрытія зѣва, когда прочіе рефлексы наклонности къ повышенію не обнаруживаютъ. Послѣдніе начинаютъ повышаться въ дальнѣйшемъ теченіи родовъ. Въ послѣродовомъ періодѣ рефлексы постепенно, въ теченіе 2—3 дней, приходятъ къ нормѣ. Имѣя въ виду, что центры сокращающей дѣятельности матки и рефлексовъ находятся, вѣроятно, въ мозгу по сосѣдству или въ одномъ мѣстѣ, авторъ объясняетъ этимъ связь родовой дѣятельности съ колебаніями рефлексовъ. Самый же фактъ повышенія рефлексовъ находитъ себѣ объясненіе въ повышенной раздражительности, въ которой находится центральная нервная система у беременныхъ, особенно въ періодъ родовъ.

Н. Какушкинъ.

114. Nijhoff.—Ein neues Verfahren zur Behandlung der Placenta praevia centralis. (Centralbl. f. Gynaek., 1895 г., № 8). **Новый способъ веденія родовъ при центральномъ предлежаніи послѣда.**

Въ концѣ беременности, при кровотеченіи, когда зѣвъ еще не пропускалъ пальца, авторъ сдѣлалъ тампонацію шейки и влагалища. Зѣвъ открылся на 2 пальца, кровотеченіе продолжалось. Тогда авторъ сдѣлалъ разрывъ (линейный) въ предлежащей части послѣда, не нарушивъ цѣлости водной оболочки. Послѣдняя, напрягаясь подъ вліяніемъ схватокъ, дѣйствовала на дальнѣйшее расширеніе зѣва. Кровотеченіе сдѣлалось незначительнымъ, и роды постепенно дошли до конца. Ребенокъ (головное предлежаніе) родился живымъ. Послѣдъ выдѣлился произвольно. Онъ имѣлъ почти посрединѣ разрывъ, илущій отъ одного края, но недоходящій до противоположнаго. Пуповина оказалась прикрѣпленною къ одной изъ половинъ дѣтскаго мѣста. Ребенокъ вышелъ, слѣдовательно, чрезъ означенный разрывъ. Авторъ совѣтуетъ всегда при центральномъ предлежаніи послѣда дѣлать подобное отверстіе въ послѣдѣ и, если оболочки окажутся также вскрытыми, оканчивать роды быстро поворотомъ и извлеченіемъ.

Н. Какушкинъ.

115. А. Пальховскій.—Ein Fall von Placenta praevia bei Zwillingen. (Centralbl. f. Gynaek., 1895 г., № 8). **Случай предлежанія послѣда при двойняхъ.**

Больная, 30 лѣтъ, беременна въ 8-й разъ. Срочные роды. Распознано краевое предлежаніе послѣда (кровотеченіе) и двойни. При зѣвѣ на 5 пальцевъ сдѣланъ поворотъ и извлеченіе перваго плода (головное предлежаніе), а затѣмъ—второго (поперечное

положение). Послѣдъ перваго плода выдѣлился произвольно, онъ былъ подлежащимъ. Послѣдъ втораго плода отдѣленъ рукой. Плоды, мальчикъ и дѣвочка, оказались слабо развитыми и скоро умерли. Родильница поправилась.

Н. Какушкинъ.

116. Krönig.—Ueber die Natur der Scheidenkeime, speciell über das Vorkommen anaërober Streptokokken im Scheidensekret Schwangerer. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 16). О природѣ микробовъ влагалища, главнымъ образомъ объ анаэробныхъ цѣпочечныхъ коккахъ въ отдѣляемомъ влагалища у беременныхъ.

Авторъ сообщаетъ дальнѣйшіе результаты своихъ наблюденій (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 1). Не найдя въ то время въ отдѣляемомъ влагалища беременныхъ микробовъ, которые росли-бы, аэробно, онъ, поставивъ секретъ влагалища (у беременныхъ) въ условія анаэробной жизни на питательныхъ средахъ, получилъ кокки, располагающіеся группами въ 12—20, ничѣмъ не отличающіеся микроскопически отъ встрѣчающихся при родильной горячкѣ цѣпочечныхъ кокковъ. Найденный авторомъ коккъ воспринимаетъ окраску по *Gram*'у, при температурѣ тѣла даетъ колоніи черезъ 24 часа, при чемъ ростъ въ плотныхъ питательныхъ средахъ начинается на 2 см. ниже поверхности субстрата. Слабо растетъ въ плохо подкисленномъ агарѣ, не даетъ роста въ жидкихъ средахъ. Молока не створаживаетъ. При 25° С. ростъ прекращается. Присутствіе его во влагалищѣ не оказываетъ вліянія на теченіе послѣродового періода; для животныхъ онъ оказался неядовитымъ. Во влагалищѣ онъ встрѣчается совмѣстно съ микробами въ видѣ короткихъ палочекъ, растущими аэробно.

Кромѣ описаннаго, авторъ находилъ во влагалищѣ еще 2 вида кокковъ, похожихъ на описанные, но не окрашивающіеся по *Gram*'у, а также бактеріи въ видѣ изогнутыхъ палочекъ.

Въ общемъ авторъ различаетъ два сорта зародышей, встрѣчающихся во влагалищѣ: одни изъ нихъ обязательно анаэробны. Какъ представительницу послѣднихъ, онъ описываетъ палочковидную бактерію.

Н. Какушкинъ.

117. I. Hohenegg.—Ueber die Verwendbarkeit der Sacralen Methode bei fixirten Retroflexion. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 16). О примѣненіи крестцоваго способа при стойкомъ перегибѣ матки назадъ.

У 35 лѣтней женщины, не рожавшей и страдавшей обильными и болѣзненными мѣсячными и болями въ животѣ, въ теченіе