

положеніе). Послѣдъ перваго плода выдѣлился произвольно, онъ былъ подлежащимъ. Послѣдъ втораго плода отдѣленъ рукой. Плоды, мальчикъ и дѣвочка, оказались слабо развитыми и скоро умерли. Родильница поправилась. *Н. Какущинъ.*

116. Krönig.—Ueber die Natur der Scheidenkeime, speciell über das Vorkommen anaërober Streptokokken im Scheidensekret Schwangerer. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 16). **О природѣ микробовъ влагалища, главнымъ образомъ объ анаэробныхъ цѣпочечныхъ коккахъ въ отдѣляемомъ влагалища у беременныхъ.**

Авторъ сообщаетъ дальнѣйшіе результаты своихъ наблюденій (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 1). Не найдя въ то время въ отдѣляемомъ влагалища беременныхъ микробовъ, которые росли-бы, аэробно, онъ, поставивъ секретъ влагалища (у беременныхъ) въ условія анаэробной жизни на питательныхъ средахъ, получилъ кокки, располагающіеся группами въ 12—20, ничѣмъ не отличающіеся микроскопически отъ встрѣчающихся при родильной горячкѣ цѣпочечныхъ кокковъ. Найденный авторомъ коккъ воспринимаетъ окраску по *Gram*'у, при температурѣ тѣла даетъ колоніи черезъ 24 часа, при чемъ ростъ въ плотныхъ питательныхъ средахъ начинается на 2 смт. ниже поверхности субстрата. Слабо растетъ въ плохо подкисленномъ агарѣ, не даетъ роста въ жидкихъ средахъ. Молока не створаживаетъ. При 25° С. ростъ прекращается. Присутствіе его во влагалищѣ не оказываетъ вліянія на теченіе послѣродового періода; для животныхъ онъ оказался неядовитымъ. Во влагалищѣ онъ встрѣчается совмѣстно съ микробами въ видѣ короткихъ палочекъ, растущими аэробно.

Кромѣ описаннаго, авторъ находилъ во влагалищѣ еще 2 вида кокковъ, похожихъ на описанные, но не окрашивающіеся по *Gram*'у, а также бактерии въ видѣ изогнутыхъ палочекъ.

Въ общемъ авторъ различаетъ два сорта зародышей, встрѣчающихся во влагалищѣ: одни изъ нихъ обязательно анаэробны. Какъ представительницу послѣднихъ, онъ описываетъ палочковидную бактерію. *Н. Какущинъ.*

117. I. Hohenegg.—Ueber die Verwendbarkeit der Sacralen Methode bei fixirten Retroflexion. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 16). **О примѣненіи крестцоваго способа при стойкомъ перегибѣ матки назадъ.**

У 35 лѣтней женщины, не рожавшей и страдавшей обильными и болѣзненными мѣсячными и болями въ животѣ, въ теченіе