

положеніе). Послѣдъ перваго плода выдѣлился произвольно, онъ былъ подлежащимъ. Послѣдъ втораго плода отдѣленъ рукой. Плоды, мальчикъ и дѣвочка, оказались слабо развитыми и скоро умерли. Родильница поправилась. *Н. Какущинъ.*

116. Krönig.—Ueber die Natur der Scheidenkeime, speciell über das Vorkommen anaërober Streptokokken im Scheidensekret Schwangerer. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 16). **О природѣ микробовъ влагалища, главнымъ образомъ объ анаэробныхъ цѣпочечныхъ коккахъ въ отдѣляемомъ влагалища у беременныхъ.**

Авторъ сообщаетъ дальнѣйшіе результаты своихъ наблюденій (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 1). Не найдя въ то время въ отдѣляемомъ влагалища беременныхъ микробовъ, которые росли-бы, аэробно, онъ, поставивъ секретъ влагалища (у беременныхъ) въ условія анаэробной жизни на питательныхъ средахъ, получилъ кокки, располагающіеся группами въ 12—20, ничѣмъ не отличающіеся микроскопически отъ встрѣчающихся при родильной горячкѣ цѣпочечныхъ кокковъ. Найденный авторомъ коккъ воспринимаетъ окраску по *Gram*'у, при температурѣ тѣла даетъ колоніи черезъ 24 часа, при чемъ ростъ въ плотныхъ питательныхъ средахъ начинается на 2 смт. ниже поверхности субстрата. Слабо растетъ въ плохо подкисленномъ агарѣ, не даетъ роста въ жидкихъ средахъ. Молока не створаживаетъ. При 25° С. ростъ прекращается. Присутствіе его во влагалищѣ не оказываетъ вліянія на теченіе послѣродового періода; для животныхъ онъ оказался неядовитымъ. Во влагалищѣ онъ встрѣчается совмѣстно съ микробами въ видѣ короткихъ палочекъ, растущими аэробно.

Кромѣ описаннаго, авторъ находилъ во влагалищѣ еще 2 вида кокковъ, похожихъ на описанные, но не окрашивающіеся по *Gram*'у, а также бактерии въ видѣ изогнутыхъ палочекъ.

Въ общемъ авторъ различаетъ два сорта зародышей, встрѣчающихся во влагалищѣ: одни изъ нихъ обязательно анаэробны. Какъ представительницу послѣднихъ, онъ описываетъ палочковидную бактерію. *Н. Какущинъ.*

117. I. Hohenegg.—Ueber die Verwendbarkeit der Sacralen Methode bei fixirten Retroflexion. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 16). **О примѣненіи крестцоваго способа при стойкомъ перегибѣ матки назадъ.**

У 35 лѣтней женщины, не рожавшей и страдавшей обильными и болѣзненными мѣсячными и болями въ животѣ, въ теченіе

болѣе чѣмъ полугодомъ было примѣнено энергичное лѣченіе массажемъ перегнутой назадъ матки. Лѣченіе это осталось безуспѣшнымъ. Тогда рѣшено было воспользоваться крестцовымъ путемъ для нарушенія сращеній и для перемѣщенія матки въ нормальное положеніе. Кончикъ былъ резецированъ, освобожденная прямая кишка отведена въ сторону, дно матки освобождено отъ сращеній и перемѣщено впередъ, для чего между прочимъ воспользовались приѣмомъ *Freund'a*: посредствомъ крѣпкой лигатуры шейка была подтянута по направленію къ правому крестцово-повздошному сочлененію. Раневая поверхность въ дугласовомъ пространствѣ была зашита, чѣмъ предупреждалась возможность перегиба матки къзади. Крестцовая рана заживала подъ марлевымъ дренажемъ. Больная выздоровѣла. При влагалитномъ изслѣдованіи матка перегнута назадъ, подвижна.

Н. Какушкинъ.

118. Г. Томсонъ.—*Hochgradige Hypertrophie der Portio vaginalis Uteri.* (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 16). **Рѣзкая гипертрофія влагалитной части шейки матки.**

Нерожавшая, 25 лѣтъ, жаловалась *только* на выпаденіе какого-то тѣла изъ влагалища. Менструація нормальна, болѣе нѣтъ, въ анамнезѣ никакихъ указаній на воспалительныя явленія. Объективно: нормальные наружныя половыя органы и влагалище, матка мала, перегнута назадъ, немного опущена. Шейка имѣетъ внѣшній видъ *penis'a*, выстоитъ изъ половыхъ органовъ. Длина канала ея достигаетъ 13,5 снтм. Покровъ ея особенностей не представляетъ. Она ампутирована по *A. Martin'u* съ послѣдующимъ выздоровленіемъ.

Н. Какушкинъ.

119. G. Leopold.—*Zur Diagnose des Placentarsitzes.* (Centralbl. f. Gyn., 1895 г., № 12). **Къ распознаванію мѣста прикрѣпленія послѣда.**

По поводу статьи *Bayer'a* (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 7) авторъ говоритъ, что онъ уже въ 1884 году, а не въ 1886 г., какъ утверждаетъ *Bayer*, впервые подмѣтилъ связь между положеніемъ трубъ беременной матки и мѣстомъ прикрѣпленія послѣда. Относительно этой связи къ подобному съ авторомъ заключенію пришелъ самостоятельно и *Bayer*. Заключение это сводится къ слѣдующему: если трубы направлены впередъ и вверхъ—послѣдъ лежитъ сзади; если трубы идутъ параллельно продольной оси тѣла—послѣдъ расположенъ спереди.

Н. Какушкинъ.