

120. Th. Landau.—Zum Thema der vaginalen Radikaloperation (Hystero-salpingo-oophorectomia vaginalis). (Centralbl. f. Gyn., 1895 г., № 12). Къ вопросу объ удаленіи матки и придатковъ черезъ влагалище.

Въ клиникѣ *Leop. Landau* при тазовыхъ нагноеніяхъ за послѣдніе 10 мѣсяцевъ были сдѣланы слѣдующія операціи. Разрѣзъ одиночныхъ, ограниченныхъ нарывовъ со стороны влагалища 17 разъ, со стороны брюха 2 раза; выздоровленіе. Чревосѣченіе съ удаленіемъ трубъ по поводу гнойныхъ скопленій въ нихъ 3 раза; выздоровленіе. Чревосѣченіе при воспалительныхъ заболѣваніяхъ придатковъ не гнойнаго характера, resp. при трубной беременности, 28 разъ; выздоровленіе съ однимъ смертнымъ исходомъ. Влагалищное сѣченіе съ удаленіемъ матки и придатковъ при гнойныхъ заболѣваніяхъ 65 разъ, при другихъ—31 разъ; выздоровленіе. Авторъ останавливается съ нѣкоторыми подробностями на послѣднихъ 96 случаяхъ. Показаніями для 65 случаевъ влагалищнаго сѣченія служили гнойныя заболѣванія трубъ, яичниковъ съ разнообразными осложненіями со стороны окружающихъ тканей до свищей въ сосѣдніе полые органы включительно. Второй рядъ случаевъ (31), не гнойныхъ заболѣваній, заключалъ въ себѣ новообразованія придатковъ и остатки старыхъ тазовыхъ нагноеній и периметритовъ (resp. parametritis chronica). Относительно техники операціи авторъ ссылается на статью свою, напечатанную раньше (Deutsch. medic. Zeitung., 1894 г., № 72).

*Н. Какушкинъ.*

121. П. Кистеръ.—Ueber die Beweglichkeit der Beckengelenke und die Bedeutung Walcher's Lagerung in der Geburtshilfe (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 10). О подвижности тазовыхъ сочлененій и о примѣненіи Walcher'овскаго положенія въ акушерствѣ.

Авторъ напоминаетъ, что мысль *Walcher*'а о подвижности тазовыхъ сочлененій у беременныхъ не нова: въ 1881 году на нее указалъ въ своей диссертациі *Корнъ*. По автору, большое отклоненіе бедеръ назадъ при *Walcher*'овскомъ положеніи возможно только отчасти благодаря подвижности въ тазобедренномъ сочлененіи, главнымъ-же образомъ благодаря перемѣщенію впередъ повздошныхъ костей, вслѣдствіе подвижности въ крестцово-повздошныхъ сочлененіяхъ. При этомъ разстояніе между остями повздошныхъ костей уменьшается, а діагональная конъюгата увеличивается. Увеличеніе конъюгаты авторъ наблюдалъ у небере-