

120. Th. Landau.—Zum Thema der vaginalen Radikaloperation (Hystero-salpingo-oophorectomia vaginalis). (Centralbl. f. Gyn., 1895 г., № 12). **Къ вопросу объ удаленіи матки и придатковъ черезъ влагалище.**

Въ клиникѣ *Leop. Landau* при тазовыхъ нагноеніяхъ за послѣдніе 10 мѣсяцевъ были сдѣланы слѣдующія операціи. Разрѣзъ одиночныхъ, ограниченныхъ нарывовъ со стороны влагалища 17 разъ, со стороны брюха 2 раза; выздоровленіе. Чревосѣченіе съ удаленіемъ трубъ по поводу гнойныхъ скопленій въ нихъ 3 раза; выздоровленіе. Чревосѣченіе при воспалительныхъ заболѣваніяхъ придатковъ не гнойнаго характера, resp. при трубной беременности, 28 разъ; выздоровленіе съ однимъ смертнымъ исходомъ. Влагалищное сѣченіе съ удаленіемъ матки и придатковъ при гнойныхъ заболѣваніяхъ 65 разъ, при другихъ—31 разъ; выздоровленіе. Авторъ останавливается съ нѣкоторыми подробностями на послѣднихъ 96 случаяхъ. Показаніями для 65 случаевъ влагалищнаго сѣченія служили гнойныя заболѣванія трубъ, яичниковъ съ разнообразными осложненіями со стороны окружающихъ тканей до свищей въ сосѣдніе полые органы включительно. Второй рядъ случаевъ (31), не гнойныхъ заболѣваній, заключалъ въ себѣ новообразованія придатковъ и остатки старыхъ тазовыхъ нагноеній и периметритовъ (resp. parametritis chronica). Относительно техники операціи авторъ ссылается на статью свою, напечатанную раньше (Deutsch. medic. Zeitung., 1894 г., № 72).

Н. Какушкинъ.

121. П. Кистеръ.—Ueber die Beweglichkeit der Beckengelenke und die Bedeutung Walcher's Lagerung in der Geburtshilfe (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 10). **О подвижности тазовыхъ сочлененій и о примѣненіи Walcher'овскаго положенія въ акушерствѣ.**

Авторъ напоминаетъ, что мысль *Walcher'a* о подвижности тазовыхъ сочлененій у беременныхъ не нова: въ 1881 году на нее указалъ въ своей диссертациі *Корнъ*. По автору, большое отклоненіе бедеръ назадъ при *Walcher'овскомъ* положеніи возможно только отчасти благодаря подвижности въ тазобедренномъ сочлененіи, главнымъ-же образомъ благодаря перемѣщенію впередъ повздошныхъ костей, вслѣдствіе подвижности въ крестцово-повздошныхъ сочлененіяхъ. При этомъ разстояніе между остями повздошныхъ костей уменьшается, а діагональная конъюгата увеличивается. Увеличеніе конъюгаты авторъ наблюдалъ у небере-

ременныхъ женщинъ. Онъ примѣнилъ *Walcher*'овское положеніе ногъ при родахъ въ 84 случаяхъ узкихъ тазовъ съ хорошими результатами. Тазы были преимущественно плоскіе, съ истинной конъюгатой въ 8—10 снтм. Изъ этого числа въ 35 случаяхъ роды окончились силами природы; въ остальныхъ случаяхъ былъ сдѣланъ профилактической поворотъ, высокіе щипцы, краниотомія (10 разъ). Между прочимъ авторъ описываетъ случай, въ которомъ, не смотря на незначительное уплощеніе таза (*conjugata diagonalis* 11½ снтм.), трое родовъ были очень трудны и давали мертвыхъ дѣтей (послѣднія были невелики). При изслѣданіи этой женщины (34 лѣтъ, беременна въ 4 разъ на 3 мѣсяцѣ) въ *Walcher*'овскомъ положеніи авторъ не нашелъ увеличенія конъюгаты и задается вопросомъ, не была ли здѣсь причиной трудныхъ родовъ неподвижность въ тазовыхъ сочлененіяхъ.

Н. Какушкинъ.

122. **E. Kummer.**—**Ueber Endresultate der Alexander'schen Operation.** (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 14). **Объ окончательныхъ исходахъ Alexander'овской операціи.**

Авторъ сдѣлалъ эту операцію 14 разъ, 4—при выпаденіи матки и 10—при перегибѣ матки назадъ. При выпаденіи матки одновременно примѣнялась и *colporaphia*. Въ одномъ случаѣ получился возвратъ, въ трехъ возврата не было въ теченіе одного года, полутора лѣтъ и трехъ лѣтъ. При перегибѣ матки кзади возвратъ наступилъ въ двухъ случаяхъ (матка была недостаточно подвижна), а въ восьми получился полный успѣхъ, при чемъ наблюденія за больными продолжались отъ 2 мѣсяцевъ до 6½ лѣтъ. Практиковалъ авторъ два способа пришиванія круглыхъ связокъ: внизъ, по направленію къ лобковой ости, и вверхъ, по направленію передней верхней повздошной ости. Послѣдній способъ легче, но онъ болѣе идетъ къ случаямъ выпаденія, тогда какъ первый—къ случаямъ перегиба кзади.

Н. Какушкинъ.

123. **H. Löhlein.**—**Zur Technik der Ausschabung.** (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 14). **Къ технику выскабливанія.**

Werth, говоря о возстановленіи слизистой матки послѣ выскабливанія, отмѣчаетъ неравномѣрность дѣйствія операціи на слизистую въ разныхъ отдѣлахъ полости матки. Авторъ относитъ это на счетъ кюретки *Recamier*, которою обыкновенно пользуется *Werth*: она имѣетъ преимущества передъ острой ложечкой *Simon-*