

ременныхъ женщинъ. Онъ примѣнилъ *Walcher*'овское положеніе ногъ при родахъ въ 84 случаяхъ узкихъ тазовъ съ хорошими результатами. Тазы были преимущественно плоскіе, съ истинной конъюгатой въ 8—10 снтм. Изъ этого числа въ 35 случаяхъ роды окончились силами природы; въ остальныхъ случаяхъ былъ сдѣланъ профилактической поворотъ, высокіе щипцы, краніотомія (10 разъ). Между прочимъ авторъ описываетъ случай, въ которомъ, не смотря на незначительное уплощеніе таза (*conjugata diagonalis* 11½ снтм.), трое родовъ были очень трудны и давали мертвыхъ дѣтей (послѣднія были невелики). При изслѣданіи этой женщины (34 лѣтъ, беременна въ 4 разъ на 3 мѣсяцѣ) въ *Walcher*'овскомъ положеніи авторъ не нашелъ увеличенія конъюгаты и задается вопросомъ, не была ли здѣсь причиной трудныхъ родовъ неподвижность въ тазовыхъ сочлененіяхъ.

*Н. Какушкинъ.*

122. **E. Kummer.**—**Ueber Endresultate der Alexander'schen Operation.** (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 14). **Объ окончательныхъ исходахъ Alexander'овской операціи.**

Авторъ сдѣлалъ эту операцію 14 разъ, 4—при выпаденіи матки и 10—при перегибѣ матки назадъ. При выпаденіи матки одновременно примѣнялась и *colporaphia*. Въ одномъ случаѣ получился возвратъ, въ трехъ возврата не было въ теченіе одного года, полутора лѣтъ и трехъ лѣтъ. При перегибѣ матки кзади возвратъ наступилъ въ двухъ случаяхъ (матка была недостаточно подвижна), а въ восьми получился полный успѣхъ, при чемъ наблюденія за больными продолжались отъ 2 мѣсяцевъ до 6½ лѣтъ. Практиковалъ авторъ два способа пришиванія круглыхъ связокъ: внизъ, по направленію къ лобковой ости, и вверхъ, по направленію передней верхней повздошной ости. Послѣдній способъ легче, но онъ болѣе идетъ къ случаямъ выпаденія, тогда какъ первый—къ случаямъ перегиба кзади.

*Н. Какушкинъ.*

123. **H. Löhlein.**—**Zur Technik der Ausschabung.** (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 14). **Къ технику выскабливанія.**

*Werth*, говоря о возстановленіи слизистой матки послѣ выскабливанія, отмѣчаетъ неравномѣрность дѣйствія операціи на слизистую въ разныхъ отдѣлахъ полости матки. Авторъ относитъ это на счетъ кюретки *Recamier*, которою обыкновенно пользуется *Werth*: она имѣетъ преимущества передъ острой ложечкой *Simon-*

*Schröder*'а въ томъ, что менѣе опасна (въ смыслѣ прободенія стѣнки) и основательнѣе и равномернѣе выскабливаетъ въ нижнемъ отдѣлѣ маточной полости, но въ днѣ матки и въ трубныхъ углахъ она не можетъ равняться съ острой ложечкой. По этому авторъ пользуется для выскабливанія дна матки острой ложечкой.

*Н. Какушкинъ.*

---

---

Редакторы: { *Д. Оттъ.*  
*Л. Личкусъ.*