

3-е) При суженіи конъюгаты ниже 67 mm. не остается уже ничего другаго, кромѣ кесарскаго сѣченія въ концѣ беременности или искусственнаго выкидыша.

*Финтиктиковъ.*

147. E. Boralevi. — *Isteropessi e Gravidanza.* — (Annali di Ostetricia e Ginecologia. Сентябрь 1897). — **Пришиванія матки и беременность.** — (Диссертація).

Еще съ того времени, когда были впервые предложены различные способы прикрѣпленія матки, въ средѣ гинекологовъ образовалось два лагеря, при чемъ одни указывали преимущества вагинофиксаци, другіе—же стояли за вентрофиксацию. Когда-же стали извѣстны тѣ осложненія во время беременности и при родахъ, которыя наблюдались у женщинъ, оперированныхъ тѣмъ или другимъ способомъ, то начали раздаваться голоса о необходимости изгнать эту операцію окончательно изъ гинекологической практики, какъ чрезвычайно опасную для лицъ, способныхъ забеременѣть. Вотъ почему А., воспользовавшись любезно предложеннымъ ему матерьяломъ Флорентинской клиники и литературой по этому вопросу, задался цѣлью разрѣшить: 1) справедливы-ли, или нѣтъ возраженія противъ этой операціи и 2) какой изъ методовъ предпочтительнѣе въ смыслѣ меньшей опасности при наступившей беременности и родахъ?

Способность къ зачатію оказывается у оперированныхъ различна, смотря по способу прикрѣпленія матки: вентрофиксированная матка, занимая въ тазу положеніе, близкое къ физиологическому, несомнѣнно находится въ условіяхъ, благопріятствующихъ концепціи; и, дѣйствительно, послѣ этой операціи часто наблюдается наступленіе беременности. Въ совершенно иныхъ условіяхъ стоитъ матка вагинофиксированная: приведенная въ состояніе патологической антефлексіи, она отличается меньшей воспримчивостью къ зачатію, и потому остается по большей части стерильной. Но все-же съ беременностью и родами послѣ вагинофиксаци приходится считаться и тогда условія различны, смотря по тому, пришита - ли матка внутри - или внѣ - брюшинно; въ первомъ случаѣ рубецъ (серозный)—не особенно плотенъ, до извѣстной степени растяжимъ и потому, или не препятствуетъ особенно росту матки, или, благодаря непрочности, разрывается; тогда какъ при внѣбрюшинномъ прикрѣпленіи получается фиброзное сращеніе, недопускающее пришитому участку матки растягиваться, въ силу чего вызывается или абортъ, или - же получается компенсаторное расширеніе свободной части матки съ

послѣдствіями въ видѣ неправильныхъ положеній плода, угрожающихъ разрывовъ матки, рѣзкой болѣзненности и дивертикуловъ мочевого пузыря.

Сопоставляя затѣмъ случаи благополучно закончившихся родовъ, А. находитъ ихъ послѣ вентрофиксаціи 90%, а послѣ вагинофиксаціи только 75% изъ забеременѣвшихъ послѣ этихъ операций, такъ что на основаніи, какъ своихъ наблюденій, такъ и данныхъ литературы считаетъ себя вправе прити къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1-е) При *retroflexio mobilis* полезно примѣненіе пессарія или произвести операцію *Alexander*'а, а при *retroflexio fixata*, требующей хирургическаго вмѣшательства, показана вентрофиксація потому, что она;

а) при современномъ состояніи хирургіи не представляетъ непосредственныхъ опасностей;

б) ставитъ матку въ фізіологическое положеніе;

в) хорошо исполненная, рѣдко даетъ рецидивы;

д) только въ видѣ исключенія ведетъ къ разстройствамъ мочевого пузыря;

е) облегчаетъ зачатіе;

ф) не мѣшаетъ теченію беременности до конца;

г) не вызываетъ осложненийъ при родахъ.

2-е) Вагинофиксацію А. не рекомендуетъ, какъ операцію, при которой:

а) гораздо легче получаютъ рецидивы;

б) матка патологически антефлексирована;

в) часто обнаруживаются разстройства со стороны мочевого пузыря;

д) концепція чрезвычайно затруднена;

е) легко получаютъ выкидыши и наконецъ

ф) при родахъ часто наступаютъ крайне опасныя осложнения.

*Финтиктиковъ.*

148. А. Noto.—*Utero biloculare od uterus septus, causa di repetute presentazione del piano laterale.*—(La rassegna d'Ostetricia e Ginecologia, Сентябрь 1897).—Двуполостная матка, причины частаго появленія боковой полости.

Остановка въ развитіи, подъ вліяніемъ которой остается перегородка, существующая между парными рудиментарными органами и обыкновенно при правильномъ развитіи постепенно исчезающая снизу вверхъ,—эта остановка въ развитіи не только