

151. Resinelli.—Significato clinico dei versamenti pleurici nei tumori dell'ovaio.—(Annali di Ostetricia e di Ginecologia, Октябрь 1897 г.).—Клиническое значение плевритическихъ выпотовъ при опухоляхъ яичника.

Изложивъ обстоятельно существующіе въ литературѣ на этотъ счетъ взгляды и давъ имъ должную оценку, А. на основаніи своихъ трехъ случаевъ и клиническаго матеріала проф. Mangiagalli (23 случаевъ) приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

- 1) Наблюдаемый иногда при опухоляхъ яичника плевритический выпотъ (hydrothorax) долженъ считаться не случайнымъ осложненіемъ, а прямымъ послѣдствіемъ этихъ опухолей.
- 2) Такого рода выпотъ появляется большей частью незамѣтно, не сопровождаясь ни лихорадкой, ни болью.
- 3) Выпотъ бываетъ чаще всего обоюдоостороннимъ; если же онъ захватываетъ одну сторону, то преимущественно — правую.
- 4) Причиной появленія подобнаго выпота должно считать или метастазъ съ опухоли яичника, или реакцію плевры на раздраженіе брюшины въ силу существованія прямого сообщенія между ними (*hiatus costolumbalis*) и возможности такимъ образомъ распространенія раздраженія съ брюшины черезъ діафрагму на плевру.
- 5) Наличность безлихорадочнаго плеврита при опухоли яичника служитъ въ большинствѣ случаевъ симптомомъ злокачественности опухоли.
- 6) Нахожденіе указаннаго плеврита служитъ показаніемъ къ скорѣйшему производству оофоректоміи и къ тщательному удалению обыкновенно въ этихъ случаяхъ имѣющихся на брюшинѣ вторичныхъ злокачественныхъ гнѣздъ.
- 7) Торакоцентезъ является недѣйствительнымъ при этомъ заболеваніи, тогда какъ удаленіе опухоли составляетъ единственный способъ наиболѣе быстраго исчезнованія hydrothorax'a.

Финтиктиковъ.