

выбирается путь или спереди матки (по Снегиреву), или сбоку — путем отслойки широкой связки съ одной стороны.

*H. Какушкинъ.*

208. А. А. Грязновъ.—**Къ вопросу о плотныхъ опухоляхъ широкой связки.**—(Дневникъ Общ. врачей при Императорскомъ Казанскомъ университѣтѣ. 1897. Вып. IV. Стр. 357).

Фиброзные опухоли широкой связки развиваются или первично, или вторично, изъ матки. Нѣкоторые авторы стоятъ только за вторичное происхожденіе этихъ опухолей. Случаи этихъ опухолей рѣдки. Въ Казани, въ клинике проф. Феноменова, на 600 чревосѣченій опухоли широкихъ связокъ встрѣтились два раза. Описываемый случай касается 40 лѣтней крестьянки, сильно истощенной. Рожала нѣсколько разъ. Опухоль замѣтила у себя 4 года назадъ; съ тѣхъ порь, особенно послѣ послѣднихъ родовъ, опухоль растетъ. Она смыстила матку кпереди и вверхъ, растигнувъ нижнимъ отрѣзкомъ своимъ задній сводъ влагалища. Чревосѣченіе. Опухоль развила между листками лѣвой широкой связки, съ маткой сообщенія неимѣеть. Широкая связка между опухолью и маткой прошита. Широкая связка вскрыта разрѣзомъ по передней поверхности опухоли; послѣдняя вылущена; избытокъ листковъ широкой связки удаленъ; сдѣлано отверстіе въ полость влагалища, куда выведенъ конецъ марли, выполнившей ложеопухоли. Больная выздоровѣла. Опухоль вѣсила 31 фунтъ, микроскопически она состояла изъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ съ прослойками соединительной ткани.

*H. Какушкинъ.*

209. I. Фуксъ.—**Случай экстирпации матки черезъ влагалище.**—(Проток. и Труды Общ. Херсонскихъ врачей за 1896/7 г. Херсонъ. 1898, стр. 60).

Больная-старуха, страдавшая полнымъ выпаденіемъ матки и язвой (ракъ?) задней губы, распространявшейся на задній сводъ. Произведено полное удаленіе матки по лигатурному способу (каждая широкая связка перевязана въ три пучка); удалена и часть стѣнки влагалища. Задняя и передняя стѣнки влагалища послѣ удаленія матки соединены другъ съ другомъ обшивнымъ кѣтгутовымъ швомъ, такимъ образомъ полость брюшины была совершенно замкнута. Больная поправилась.

*H. Какушкинъ.*