

12 окт. 1891 г. Лапаротомія и удаленіе правой трубы и яичника; съ лѣвой стороны придатки оказались здоровыми, безъ сращеній, почему и оставлены.

На 24 день послѣ операціи пациентка выписалась здоровою.

При изслѣдованіи удаленныхъ придатковъ на нихъ повсюду видны были старыя фиброзныя сращенія и признаки совершенно свѣжаго воспаленія. Серозный покровъ ихъ гиперэмированъ съ многочисленными петехиальными пятнами. Брюшной конецъ трубы не былъ закупоренъ, но фимбрии припухли, налиты. При разрѣзѣ трубы изъ нея вытекло небольшое количество жидкаго гноя.

Микроскопическое изслѣдованіе трубы показало только признаки, свойственные вообще катарральному воспаленію слизистыхъ оболочекъ.

Ф. Кюнъ.

33. Jacobs. Pyosalpinx et papillome des ovaires. (Bulletin de la société Belge de gynecol. et d'obstetrique. 1892. N-os 1 et 2) Pyosalpinx и papilloma яичниковъ.

Г-жа X., 43 л., multipara, всегда пользовавшаяся хорошимъ здоровьемъ сообщила д-ру Jacobs: шесть мѣсяцевъ тому назадъ почувствовала боли въ области яичниковъ, которыя усиливались съ теченіемъ времени; животъ постепенно увеличивался въ объемѣ. Появились другіе болѣзненные симптомы: бессонница, отсутствие аппетита, затрудненная дефекація, а также мочеиспусканіе. Наружное изслѣдованіе: животъ значительно увеличенъ въ объемѣ и въ нижней части прощупывается опухоль; скопленіе жидкости въ брюшной полости.

Внутреннее изслѣдованіе: шейка матки мала отклонена назадъ; позади гѣла матки прощупывается малоболѣзненная, неподвижная и флюктурирующая опухоль, выполняющая малый тазъ, придатки матки нельзя было опредѣлить.

Діагнозъ: киста яичника. Лапаротомія 8-го янв. 1892 г. По вскрытіи брюшины оказалось, что опухоль—фаллопиева труба, сильно растянутая жидкостью, съ тонкими стѣнками. Наложивъ лигатуру на уточненную часть, которая прилежала къ маткѣ и отдѣливъ сращенія, Jacobs удалил опухоль. Другая труба найдена здоровою. Яичники папилломатозны и удаленіе было затруднительно вслѣдствіе сращеній съ кишками; сращенія были отдѣлены термокаутеромъ *Miculicz'a*. Наложены швы на брюшную рану. Удаленная опухоль (фаллопиева труба) была растянута серозно-гнойною жидкостью до значительныхъ размѣровъ, высота опухоли = 22 cent. какъ показало измѣреніе. Послѣоперационный періодъ безъ осложнений. Черезъ 17 дней пациентка выписалась и общее состояніе здоровья найдено удовлетворительнымъ.

А. Лапина.