

34. **Gross. Contribution à l'étude des fibro-myomes du ligament large** (Sixième Congrès de Français de Chirurgie. Semaine Medicale № 19). **Къ учению о фиброміомахъ широкой связки.**

Плотные опухоли широкой связки встрѣчаются крайне рѣдко и мало изучены. *Virchow* первый указалъ на возможность прямого развитія фиброміомъ изъ тканей широкой связки. *Schetelig, Langenbeck, Gayet, Billroth, Schroeder, Tedenert* и др. наблюдали интралигаментарныя фиброміомы безъ связи съ маткой. Фиброміомы на ножкѣ гораздо демонстративнѣе, но встрѣчаются еще рѣже; до сихъ поръ опубликовано было только 5 случаевъ: *Mikulicz'a, Sängner'a, Borker'a, Biflinger'a* и *Doran'a*. Авторъ удалилъ фиброміому на ножкѣ вѣсомъ 2500 граммъ изъ правой широкой маточной связки. По мѣсту происхожденія, авторъ соглашается съ *Sängner'омъ*, считая таковымъ мышечныя волокна широкой связки. Діагностика ставится очень трудно и только въ случаѣ *Breisky* она была поставлена правильно, другіе же авторы смѣшивали съ опухолью яичника. Опухоли эти удаляются, если онѣ снабжены ножкой—какъ яичниковыя, если же таковой нѣтъ, то онѣ должны быть разсматриваемы какъ подперитонеальныя опухоли матки.

П. Садовскій.

35. **T. Cramer: Parametritis abscedens bei einem 12 jährigem Mädchen** (Deutsche med. Wochenschr., 1892, № 33). **Parametritis abscedens у 12 лѣтней дѣвочки.**

Заболѣваніе начинается головными болями, длящимися 2 дня, затѣмъ выступаютъ на первый планъ коликообразныя боли въ животѣ, съ болевymi ощущеніями при пальпации въ области Colon descendens. Оніи только незначительно и кратковременно уменьшаютъ боль и вслѣдствіе этого прополаскиваніе кишечника невозможно. Принятіе *Ol. Ricini* вызываетъ рвоту. Теплыя припарки уменьшаютъ коликообразныя боли только во время примѣненія ихъ. Какъ только онѣ охлаждаются боли усиливаются. Такой Status продолжается съ 7 сентября до 15-го, когда появилась явно сплюснутая дефекація. Діагностицируется стенозъ кишки. Не смотря на примѣненіе наркотическихъ средствъ коликообразныя боли настолько мучительны, что ребенокъ мечется въ кровати и кричитъ благимъ матомъ. Новое изслѣдованіе показываетъ усиленную чувствительность въ лѣвой паховой области, въ правой болѣзненность значительно меньше. Вслѣдствіе этого кромѣ стеноза кишки предполагается воспалительный процессъ брюшины этой мѣстности. Изслѣдованіе подъ наркозомъ показало: абсцессъ въ лѣвомъ заднемъ сводѣ, который выдается больше кзади и вдавливаютъ переднюю стѣнку гесті въ просвѣтъ кишки. Пробный проколъ въ заднемъ сводѣ. Извергается въ большомъ количествѣ зеленый пихорозный гной. Трубка троакара оставляется въ отверстіи абсцесса. Назначаются теплыя ванны и теплыя припарки изъ льнянаго сѣмени. Коликообразныя боли послѣ пункціи значительно уменьшаются; появился аппетитъ. 20 сентября вновь наступаютъ боли вслѣдствіе застоя истеченія. 23 сентября вторичная пункція. Значительное облегченіе всѣхъ симптомовъ. Въ послѣдующіе дни мѣсто прокола опять заросло и боли возобнови-

лись, но 27 сент. во время дефекаціи выдѣлилась масса гноя. Съ тѣхъ поръ больная стала медленно поправляться. 15 октября послѣдній разъ выдѣлился гной. На слѣдующій день температура упала до 36,5°. Черезъ 3 мѣсяца послѣ начала заболѣванія больная стала посѣщать школу.

Что касается этиологін параметритовъ у дѣтей, то она крайне темна. Ни *Schröder*, ни *Bandl*, ни *Fritsch* даже не упоминаютъ этого заболѣванія у не менструирующихъ еще дѣвочекъ. Объ инсультѣ въ половой сферѣ въ данномъ случаѣ и рѣчи быть не могло, ибо дѣвственная плева была цѣла и невредима. Въ анамнезѣ имѣются слѣдующія данныя: за 18 дней до заболѣванія дѣвочка эта упала на улицѣ такъ, что ударившись лѣвымъ бокомъ покатила нѣсколько разъ. Это сотрясеніе вызвало перемѣну въ настроеніи ребенка, бывшаго раньше веселымъ, и жалобы на боль въ животѣ, которая къ сентябрю такъ значительно усилилась. Авторъ отмѣчаетъ, какъ причинный моментъ, еще запоры, которыми больная всегда страдала. Сильное сотрясеніе во время паденія при переполненномъ кишечникѣ могло вызвать значительное отслоеніе эпителия гесті и такимъ образомъ дать доступъ инфекціи къ тазовой клѣчаткѣ и этимъ путемъ вызвать, имѣвшійся въ данномъ случаѣ, абсцессъ.

Б. Фейнбергъ.