

213. М. А. Штраухъ.—Простой методъ экстирпаціи матки черезъ влагалище.—(Медицинское Обозрѣніе. 1898 г., февраль-стр. 177).

Оставляя въ сторонѣ способъ удаленія матки отжиганіемъ (*Mackenrodt*), какъ способъ ненадежный въ смыслѣ предупрежденія кровотеченія, авторъ существующіе способы подводитъ подъ два метода: лигатурный и зажимный. Лигатурный съ кетгутомъ не можетъ считаться безопаснымъ, въ виду неимѣнія вѣрныхъ приѣмовъ для обеззараживанія кетгута; лигатурный съ шелкомъ имѣетъ недостаткомъ трудность послѣдовательнаго удаленія лигатуръ. Зажимный методъ, при всѣхъ своихъ преимуществахъ передъ лигатурнымъ въ смыслѣ ускоренія операціи, даетъ массу осложняющихъ моментовъ въ послѣоперационномъ періодѣ (затрудненіе мочеиспусканія и дефекаціи, болѣзненность, пролежни, вторичная инфекция, послѣдовательное кровотеченіе). Способъ автора, который онъ рекомендуетъ при доброкачественныхъ заболѣваніяхъ, состоитъ въ наложеніи на каждую широкую связку по одной эластической лигатурѣ. Для этого матка обычными приѣмами выводится, отдѣляется отъ мочевого пузыря и задняго свода, эластическая лигатура накладывается по возможности подалеже отъ удаляемаго органа (чтобы оставить большую культю и тѣмъ предупредить соскальзываніе лигатуры) и укрѣпляется прочной шелковой нитью. Эластическія лигатуры во всѣхъ случаяхъ, оперированныхъ по этому способу (23), не вызвали никакихъ осложнений; удалялись обыкновенно на 15-й день, легкимъ потягиваніемъ. При удаленіи раковопораженной матки авторъ пользуется зажимами и приборомъ *Raquelin'a*.

Н. Какушкинъ.

214. Проф. Э. Ф. Веллинъ.—Случай уродства половыхъ органовъ, затрудняющаго опредѣленіе пола и гражданскихъ правъ.—(Еженедѣльникъ, 1898 г., № 8, стр. 141).

Дѣвушка 24 л. Ростъ 169 см.; строеніе скелета мужское, Грудныхъ железъ нѣтъ. Черты лица грубыя. Лобокъ слабо покрытъ волосами. Имѣются валикообразныя большія губы, между которыми выступаетъ увеличенный, покрытый крайней плотью, похотникъ, способный набухать до толщины мизинца. Между большими губами—щель, закрытая сзади воронкообразно натянутой спайкой. Въ днѣ этой воронки отверстіе, окаймленное плевой, ведущее въ слѣпой мѣшокъ. Матки и придатковъ нѣтъ. Въ толщѣ большихъ губъ, легко ускользающія въ брюшную по-

лость, прощупываются два кругловатых тѣла, очевидно мужскія яички. Отверстіе мочевого протока находится у передняго края воронки. Больная никогда не менструировала и не имѣетъ никакихъ половыхъ влеченій. Данный случай отнесенъ авторомъ къ ложному внутреннему мужскому двухспастію. *Н. Какушкинъ.*

**215. А. І. Зильберминцъ.—Къ казуистикѣ воображаемой беременности.**—(Еженедѣльникъ, 1898 г., № 10, стр. 183).

Больная 32 лѣтъ, изъ невронатической семьи. Мужъ здоровъ. Родила три раза, несмотря на разныя мѣры, примѣнявшіяся противъ забеременѣнія. Чтобы предупредить четвертую беременность, она положила на кондомъ, но послѣдній во время одного изъ сношеній разорвался. Это потрясло больную, и съ этого момента она стала считать себя беременной, несмотря ни на какія противуположныя увѣренія. Особенно беспокоили еѣ грудныя железы, которыя, какъ убѣдился авторъ, дѣйствительно, благодаря самоушенію больной, получили оформленность, нѣкоторую напряженность, какъ-бы увеличались, а околососковый кружокъ сдѣлался болѣе темноокрашеннымъ. Съ больной было нѣсколько истерическихъ припадковъ. Особенно волненія ея сдѣлались безпрерывными передъ срокомъ наступленія очередныхъ мѣсячныхъ. Послѣднія не заставили себя долго ждать, что на душевное состояніе больной подѣйствовало очень благотворно. Грудныя железы быстро возвратились къ прежнему своему состоянію.

*Н. Какушкинъ.*

**216. Э. М. Собѣстіанскій.—Коллекція слѣпковъ *portionis vaginalis*.**—(Протокъ засѣд. Императорскаго Кавказск. Мед. Общ. 16 янв. 1898 г., № 13, стр. 387).

Влагалищная часть шейки обнажается гуттаперчевымъ зеркаломъ, вытирается ватой, смазывается зеленымъ мыломъ. Въ зеркало вливается жидкій гипсъ, который черезъ 3—5 минутъ вмѣстѣ съ зеркаломъ удаляется въ твердомъ видѣ. Въ полученную такимъ образомъ обратную модель вливается снова жидкій гипсъ для полученія прямого слѣпка, а этотъ послѣдній покрывается тонкимъ слоемъ розоватоокрашеннаго растопленнаго воска. Коллекція автора состоитъ изъ 35 слѣпковъ (14 сняты съ нерожавшихъ женщинъ). Она предназначается авторомъ какъ пособіе при изученіи женскихъ болѣзней.

*Н. Какушкинъ.*