

217. Проф. А. А. Муратовъ.—Введение въ курсъ акушерства и гинекологіи въ связи съ клиническими методами преподаванія.—(Отд. отт. изъ Ученыхъ Записокъ Императорскаго Юрьевскаго университета, № 2, 1898 г. Юрьевъ. 1898 г.).

Въ этой вступительной лекціи, помнявъ добрымъ словомъ своихъ предшественниковъ по кафедрѣ, авторъ кратко касается исторіи открытія *Semmelweis's'a* и дѣлаетъ очеркъ современнаго значенія антисептики и асептики въ акушерствѣ. Клиническое родовспоможеніе не можетъ еще, по мнѣнію автора, обойтись одной чистой асептикой. Всецѣло послѣднія приложима лишь къ нормальнымъ родамъ и нормальному послѣродовому періоду. Между прочимъ, авторъ съ увѣренностью высказывается о положительныхъ результатахъ серотерапіи въ послѣродовыхъ заболѣваніяхъ. Говоря о клиническомъ преподаваніи акушерства и гинекологіи, авторъ рельефно отмѣчаетъ, насколько женскій организмъ даже въ физиологическихъ своихъ отпавленіяхъ нуждается во врачебной помощи. Необходимо для этого, чтобы каждый врачъ былъ приученъ къ основательному разбору больныхъ и къ клиническому наблюденію. Профессоръ своей цѣлью преподаванія ставитъ—обращать вниманіе слушателей на самые обыденные случаи, встрѣчающіеся въ практикѣ на каждомъ шагѣ. При этомъ въ клиникѣ на глазахъ слушателей должны примѣняться всѣ современные научные методы лѣченія. На первомъ планѣ изученія практическаго акушерства должна стоять выработка умѣнія ставить показанія къ тому или другому воздѣйствію. При всемъ этомъ программа преподаванія должна быть свободна отъ узкаго практицизма: она должна приучать будущихъ практическихъ дѣятелей руководиться въ своемъ врачеваніи наукой, какъ путеводной звѣздой.

Н. Какушкинъ.

218. О. А. Рѣзниковъ.—Къ вопросу о missed abortion.—(Еженедѣльникъ, 1898 г., № 15, стр. 283).

Случаи продолжительнаго задержанія мертвыхъ плодовъ въ маткѣ авторъ дѣлитъ на 2 группы: къ первой группѣ отнесены случаи, когда плодныя яйца умираютъ на второмъ или третьемъ мѣсяцѣ беременности, ко второй тѣ, когда смерть плодовъ наступаетъ на четвертомъ, пятомъ, или болѣе позднемъ мѣсяцѣ. Случаи первой группы характеризуются повторными кровотечениями, или періодическими, или неправильными, постепенно ослабѣвающими по мѣрѣ приближенія къ концу беременности; изверженіе яйца въ этихъ случаяхъ сопровождается небольшими кровопотерями.

Смерть плода въ случаяхъ второй группы происходитъ безъ всякихъ внѣшнихъ припадковъ, но за то изверженіе плода сопровождается кровотеченіемъ.

Авторъ описываетъ два собственныхъ случая, одинъ изъ которыхъ относится къ первой группѣ, другой—ко второй. 1) 23 л., первобеременная. Черезъ 2 $\frac{1}{2}$ мѣсяца послѣ послѣднихъ кровей—кровотеченіе, продолжавшееся около 3 недѣль, съ перерывами. Впослѣдствіи были небольшія кровопотери раза 2—3. На 9-мъ мѣсяцѣ (въ концѣ) извергнуто яйцо, 8 снтм. длины, съ зародышемъ, длиной около 1 снтм. Возрастъ яйца—8—10-недѣльный. 2) Многоплодная. На 4-мъ мѣсяцѣ беременности получила ударъ въ спину. На 8-мъ мѣсяцѣ—сильное кровотеченіе и родился 4-мѣсячный плодъ мертвый.

Н. Какушкинъ.

219. Г. Э. Вонштедтъ.—Случайная прививка рака при полномъ удаленіи матки.—(Боан. Газ. Боткина 1898, №№ 11 и 12, стр. 473 и 530).

Существуютъ факты вторичныхъ раковыхъ заболѣваній, которые нельзя объяснить иначе, какъ только заразительностью рака. Факты эти наблюдались въ естественномъ ихъ теченіи и проверялись опытнымъ путемъ. Авторъ довольно подробно перечисляетъ ихъ, дѣля на три разряда; къ первому разряду относятся случаи прививокъ раковой заразы на разстояніи, напр. когда развивается ракъ матки при существованіи рака-яичника, путемъ проникновенія раковыхъ частицъ черезъ трубу, или ракъ шейки при существованіи рака дна матки; ко второму разряду относятся случаи прививокъ отъ соприкосновенія; къ третьему—случаи прививокъ при операціяхъ; напр. при удаленіи раковопораженной матки черезъ влагалище. На послѣдній рядъ случаевъ обратилъ вниманіе *Winter*, а за нимъ описали рядъ случаевъ *Schopf*, *Odebrecht*, *Thorn*. Прививка рака наблюдалась и при зондированіи матки, у которой былъ пораженъ ракомъ шеечный каналъ, при проколѣ, когда имѣлся *peritonitis carcinomatosa*, при удаленіи раковопораженного яичника и т. под. Случай, описываемый авторомъ (изъ клиники проф. А. И. Лебедева), касается 46 лѣтней больной у которой, въ виду ракового пораженія шеечнаго просвѣта и наружнаго зѣва, сдѣлано полное удаленіе матки, причемъ, по причинѣ узкости влагалища, послѣднее расширено двумя боковыми разрѣзами. Разрѣзы эти потомъ были зашиты. Больная послѣ операціи быстро стала поправляться. Черезъ 6 мѣсяцевъ, при хорошемъ общемъ состояніи, у нея констатированъ еле замѣтный