

Резюмируя сущность докладовъ и преній, авторъ высказывается что гинекологическія темы, представлявшія высокій интересъ, были разработаны тщательно, чѣмъ акушерскія,

Н. Какушкинъ.

222. **В. С. Гурвичъ.**—**Graviditas extrauterina.**—(Еженедѣльникъ, 1898, № 11, стр. 205).

Больная 40 л., рожавшая, уже 4 недѣли страдаетъ болями внизу живота, начавшимися внезапно и вначалѣ сопровождавшимися кровотеченіемъ. Была ли задержка мѣсячныхъ, неизвѣстно. Авторомъ обнаружена громадная опухоль съ боковъ и сзади матки, мѣстами зыблющаяся; лѣвая труба прощупана въ видѣ шнура. Ни знобовъ, ни повышенія температуры не было; пульсъ былъ нормальный. Матка очень мало увеличена, прижата къ лону. На основаніи этихъ данныхъ авторъ рѣшилъ, что онъ имѣеть здѣсь дѣло съ трубной беременностью, прервавшеюся въ самомъ началѣ. Лѣченіе выжидательное. Черезъ 2 приблизительно мѣсяца найдены остатки опухоли преимущественно слѣва отъ матки; придатки нормальны.

Н. Какушкинъ.

223. **С. С. Геренштейнъ.**—**Къ казуистикѣ пуэрперальныхъ невритовъ.**—(Еженедѣльникъ, 1898, № 12, стр. 224).

Больная 23 л., изъ невропатической семьи, родила въ 3-й разъ, три дня назадъ. Роды правильные, послѣродовая инволюція безъ осложнений. На 2-й день послѣ родовъ появились сильныя, то ослабѣвающія, то усиливающіяся боли въ лѣвомъ плечѣ, преимущественно во время движеній руки. Боли продолжались болѣе 4 мѣсяцевъ. Лѣченіе: подкожныя впрыскиванія кокаина, затѣмъ массажъ и электричество. Совпаденіе болей съ послѣродовымъ періодомъ заставило автора отнести это страданіе къ ряду пуэрперальныхъ невритовъ.

Н. Какушкинъ.

224. **Г. Н. Реймеръ.**—**Внутриматочное кровотеченіе во время беременности.**—(Еженедѣльникъ, 1898, № 14, стр. 263).

Больной около 40 лѣтъ, многорожавшая, беременна въ концѣ 4-го мѣсяца. На третьемъ мѣсяцѣ беременности упала, послѣ чего появилась общая слабость, малокровіе, боли въ животѣ и постепенно растущая опухоль въ животѣ, достигшая до подложечной впадины (окружность живота 98 снтм.). При внутреннемъ изслѣдованіи опухоль оказалась увеличенной маткой; сердцебіенія плода не слышно, части его не прощупываются. Въ концѣ 4-го и