

началь 5-го мѣсяца беременности—кровотеченіе изъ матки и преждевременные роды; плодъ живой, длиной 24 сѣтм., соотвѣтствующій началу 5-го мѣсяца беременности. Изъ полости матки вышло кровяныхъ сгустковъ съ полведра. Матка затѣмъ сокращалась вяло, но послѣродовой періодъ прошелъ благополучно.

*Н. Какушкинъ.*

225. **М. Головчинеръ.**—**О предлежаніи плаценты.**—(Медицина. 1898 г., №№ 14 и 15).

Статья представляетъ сводку мнѣній по этому вопросу, выказанныхъ на одномъ изъ засѣданій конгресса нѣмецкихъ гинекологовъ въ Лейпцигѣ въ іюнѣ 1897 года. Рѣчь идетъ главнымъ образомъ объ этиологіи и лѣченіи placenta praevia. Въ качествѣ этиологическаго момента большинствомъ отмѣчался эндометритъ а также атрофія слизистой оболочки матки. Съ анатомической точки зрѣнія placenta praevia разсматривалась не столько, какъ результатъ непосредственнаго прикрѣпленія яйца у внутренняго зѣва, сколько какъ результатъ неправильнаго разрастанія отпадающей оболочки. При лѣченіи главное вниманіе обращается на кровотеченіе, для борьбы съ которымъ примѣняется тампонація влагалища (или кольпейризы матки), разрывъ пузыря и поворотъ.

*Н. Какушкинъ.*

226. **С. И. Кузьминъ.**—**Къ вопросу о пузырьно-влагалищныхъ свищахъ и ихъ оперативномъ лѣченіи.**—(Больничн. Газ. Боткина, 1898 г. №№ 3 и 4, стр. 87 и 147).

За девять лѣтъ (1889—1897 гг.) въ Саратовской губернской земской больницѣ на 1004 гинекологическихъ больныхъ, подвергшихся операціямъ, съ пузырьно-влагалищными свищами было 44 (4,36%). Изъ этого числа 33 были крестьянки (75%). Наичаще были въ возрастѣ 21—25 лѣтъ. Наичаще причиной образованія свищей были неправильности родового акта, а затѣмъ инфекция. Наичаще свищи сшивались послѣ сплошнаго, широкаго окровавленія краевъ; слизистая пузыря въ шовъ не захватывалась. Однажды были окровавлены не самыя стѣнки свища, а слизистая рукава на извѣстномъ отдаленіи отъ свища; однажды примѣненъ лоскутный способъ; два раза—episioleisis. Швы почти исключительно шелковые, иногда металлическіе. Снимались на 6—8 дни. Постоянно примѣнялся катетеръ à demeure, удаляемый на 9—10 дни. Послѣ однократнаго сшиванія зажили свищи въ 21 случаѣ (47,74%), послѣ двукратнаго въ 3 случаяхъ (6,81%),