

съ запахомъ. На 7-й и 8-й день т^о нормальна, родильница встала, но черезъ 3 дня снова слегла. Температура тѣла достигла до 41°; повторные знобы и *отсутствіе жалобъ на какіе либо боли*. Черезъ нѣсколько обнаружены слабыя явленія воспаленія лѣваго легкаго (подъ ключицей), и только на 28-й день послѣ родовъ стала ощущаться боль въ лонномъ сочлененіи, припухлость здѣсь и какъ бы расхожденіе концовъ лонныхъ костей. Зыбленія не ощущалось. Передъ смертью появилась боль и припуханіе праваго бедра въ верхней трети. Вскрытие показало расхожденіе лонныхъ костей на 1,5 сант., гнойникъ сзади лона съ куриное яйцо,— гной проложилъ себѣ по влагалищу портняжной мышцы путь въ клѣтчатку бедра и голени. Гнойникъ въ верхней долѣ лѣваго легкаго. Въ гною найдены стрептококки. *H. Какушкинъ.*

231. Г. И. Ржечковскій и С. А. Сыркинъ-Шкловскій.—Неполная гипоспадія, непроходимость дѣвственной плевы и скопленіе крови въ рукавѣ.—(Врачъ. 1898 г., № 3, стр. 71).

Крестьянка 19 лѣтъ; первыя мѣсячныя пришли 14 лѣтъ и ходили чрезъ 4 недѣли по 3 дня, обильно. Пять мѣсяцевъ назадъ крови прекратились; больная стала страдать болями внизу живота и въ крестцѣ, головокруженіями и желудочными разстройствами. При изслѣдованіи найдено: въ наружныхъ половыхъ органахъ ничего ненормального, кроме полной непроходимости дѣвственной плевы и зіянія мочеиспускательного отверстія. Влагалище растянуто жидкимъ содержимымъ, оказавшимся, послѣ разрѣза плевы, черной густой кровью. Между влагалищемъ и мочевымъ протокомъ опредѣлено сообщеніе,—результатъ недоразвитія протока (гипоспадія). Черезъ три мѣсяца найдено, что протокъ съ полостью влагалища не сообщается; больная правильно менструируетъ. Авторы цитируютъ *Битнеръ*, который въ литературѣ нашелъ всего 30 случаевъ гипоспадіи у женщинъ, но случая, гдѣ недоразвитіе протока занимало среднюю часть его, онъ въ литературѣ не встрѣтилъ. *H. Какушкинъ.*

232. В. Н. Массенъ.—Къ вопросу о предохранительномъ и лѣчебномъ поворотѣ при узкомъ тазѣ.—(Врачъ. 1898 г., № 1, стр. 6).

Въ строгомъ смыслѣ предохранительнымъ поворотомъ можно назвать поворотъ, совершаемый до отхожденія водъ, когда ничего еще не известно относительно свойства родовой дѣятельности матки и степени приспособляемости предлежащей части послѣ