

153. P. Carnot.—*De l'hémostase par la gélatine.*—(La Presse médicale. 1897 г., № 77, стр. 167).—Желатина, какъ кровоостанавливающее средство.

Свойство желатины свертывать кровь указано въ 1896 году *Dastre*'омъ и *Floresco*. Получающійся отъ желатины свертокъ крови способенъ быстро организоваться. Авторъ вмѣстѣ съ *Cognil*'емъ испыталъ питательныя и всасываательныя свойства желатины и другихъ бѣлковыхъ веществъ (помѣщаа куски губки, смоченные въ этихъ веществахъ, въ брюшную полость собакъ и наблюдая вростаніе этихъ кусковъ) и пришелъ къ заключенію, что желатина занимаетъ въ этомъ отношеніи первенствующее мѣсто. Для остановки кровотечений употреблялъ онъ 5%—10% растворы желатина въ водѣ, или лучше въ физиологическомъ соляномъ растворѣ, хорошо обезложеніе при температурѣ не выше 115°. При кровотеченіи изъ матки автору пришлось лишь одинъ разъ испробовать вирсыканіе этого средства, и съ успѣхомъ,—при фибромахъ матки. Тамионы, смоченные въ растворѣ этого средства, прекрасно замѣняютъ зажимчики при раненіяхъ сосудовъ. Введенная въ вену, желатина повышаетъ свертываѣмость крови.

*H. Какушкинъ.*

154. Bonnaire.—*Placenta praevia hémorragique et accouchement méthodiquement rapide.*—(La Presse mдicale. 1897 г. № 67).—Быстрое родоразрѣшеніе при предлежаніи послѣда.

Перечисливъ условія, при которыхъ обыкновенно наступаетъ и поддерживается кровотеченіе при предлежаніи дѣтскаго мѣста, авторъ разбираетъ различныя пособія, направляемыя обыкновенно къ остановкѣ кровотеченія. Среди нихъ онъ на первомъ мѣстѣ ставить искусственный разрывъ плоднаго пузыря и влагалищную тампонацию. Второе мѣсто отводится имъ горячимъ влагалищнымъ спринцеваніямъ и внутриматочной тампонацией. Всѣ эти пособія слишкомъ недостаточно приоровлены къ обезначенію жизни плода, а нѣкоторые изъ нихъ, какъ ранній разрывъ пузыря, представляютъ даже опасность для нея. Авторъ настаиваетъ поэтому, при кровотеченіи отъ предлежанія дѣтскаго мѣста, стремиться къ опорожненію матки отъ ея содержимаго. Для этой цѣли, какъ предварительный пріемъ, необходимо насильственное расширение шеечнаго просвѣта. Лучшимъ орудіемъ для такого расширенія авторъ считаетъ пальцы акушера и совѣтуетъ операцию эту дѣлать такъ. Больная подвергается глубокому усыплѣнію; въ отверстіе наружнаго зѣва вводится указательный палецъ

одной руки, которымъ стараются проникнуть до внутренняго зѣва и расширить послѣдній, массируя его и непроникая по возможности въ полость матки. Когда явится возможность, не вынимая пальца, вводятъ рядомъ съ нимъ указательный палецъ другой руки, которымъ также проникаютъ до внутренняго зѣва, и затѣмъ, массируя двумя пальцами, растягиваютъ просвѣтъ шейки медленно до того, чтобы провести средній палецъ правой руки. Рядомъ съ остальными вводятся постепенно послѣ того средній палецъ лѣвой руки и безымянныя пальцы. Расширеніе считается доконченнымъ, если пальцами, введенными въ просвѣтъ шейки, удастся касаться до стѣнокъ таза. Послѣ этого дѣлается поворотъ и извлеченіе плода. Авторъ описываетъ три очень удачно окончившихся случая: 1) 23 лѣтъ, второродящая, беременная на 7-мъ мѣсяцѣ, шейка не слажена, зѣвъ закрытъ. Послѣ расширенія поворотъ и извлеченіе мертваго плода въ 1700 грам. 2) IV-parа, 33 лѣтъ, беременная на 7 мѣс. Расширеніе въ теченіе 10 мин. Поворотъ и извлеченіе живого плода въ 2900 грам., 3) многородящая, 34 л., беременная на 8 мѣс. Расширеніе въ 10 мин.; поворотъ и извлеченіе живого плода въ 3320 грам. Родильницы поправились.

Н. Какушикінъ.

---

155. Depasse.—Des hémorragies dans les maladies P infectieuses.—(La France m dical et Paris m dical. 1897 г., № 51, стр. 803).—О кровотеченияхъ при обще-заразныхъ болѣзняхъ.

Авторъ описываетъ два случая, гдѣ въ начальныхъ стадіяхъ кори у virgo intacta 26 л., и таковой же 21 года имѣло мѣсто въ теченіе нѣсколькихъ дней маточное кровотеченіе, при совершенномъ отсутствіи какихъ либо указаній на заболѣванія полового прибора. Кровотеченіе появилось въ первомъ случаѣ черезъ 8 дней послѣ конца очередныхъ мѣсячныхъ, а во второмъ—черезъ 12 дней. Прекращеніе кровотеченія совпало съ появлениемъ сыпи.

Н. Какушикінъ.

---

156. Keffer.—La menstruation dans ses rapports avec la pathologie g n rale.—(L'Obst trique 1897 г., № 4; стр. 289).—Мѣсячные очищенія съ общепатологической точки зрења.

Авторъ смотритъ на менструацію, какъ на процессъ секреторный, существующій для освобожденія женского организма отъ накапляющихся въ крови ненужныхъ веществъ. Процессъ этотъ подобенъ процессамъ потоотдѣленія и мочеотдѣленія. При тѣхъ