

одной руки, которымъ стараются проникнуть до внутренняго зѣва и расширить послѣдній, массируя его и непроникая по возможности въ полость матки. Когда явится возможность, не вынимая пальца, вводятъ рядомъ съ нимъ указательный палецъ другой руки, которымъ также проникаютъ до внутренняго зѣва, и затѣмъ, массируя двумя пальцами, растягиваютъ просвѣтъ шейки медленно до того, чтобы провести средній палецъ правой руки. Рядомъ съ остальными вводятся постепенно послѣ того средній палецъ лѣвой руки и безымянные пальцы. Расширеніе считается законченнымъ, если пальцами, введенными въ просвѣтъ шейки, удастся касаться до стѣнокъ таза. Послѣ этого дѣлается поворотъ и извлеченіе плода. Авторъ описываетъ три очень удачно окончившихся случая: 1) 23 лѣтъ, второродящая, беременная на 7-мъ мѣсяцѣ, шейка не сглажена, зѣвъ закрытъ. Послѣ расширения поворотъ и извлеченіе мертвого плода въ 1700 грм. 2) IV-рага, 33 лѣтъ, беременная на 7 мѣс. Расширеніе въ теченіе 10 мин. Поворотъ и извлеченіе живого плода въ 2900 грм., 3) многородящая, 34 л., беременная на 8 мѣс. Расширеніе въ 10 мин.; поворотъ и извлеченіе живого плода въ 3320 грм. Родильницы поправились.

Н. Какушкинъ.

155. Depasse.—Des hémorragies dans les maladies infectieuses.—(La France médicale et Paris médical. 1897 г., № 51, стр. 803).—**О кровотеченіяхъ при обще-заразныхъ болѣзняхъ.**

Авторъ описываетъ два случая, гдѣ въ начальныхъ стадіяхъ кори у virgo intacta 26 л., и таковой же 21 года имѣло мѣсто въ теченіе нѣсколькихъ дней маточное кровотеченіе, при совершенномъ отсутствіи какихъ либо указаній на заболѣванія полового прибора. Кровотеченіе появилось въ первомъ случаѣ черезъ 8 дней послѣ конца очередныхъ мѣсячныхъ, а во второмъ—черезъ 12 дней. Прекращеніе кровотеченія совпало съ появленіемъ сыпи.

Н. Какушкинъ.

156. Keffer.—La menstruation dans ses rapports avec la pathologie générale.—(L'Obstétrique 1897 г., № 4; стр. 289).—**Мѣсячныя очищенія съ общепатологической точки зрѣнія.**

Авторъ смотритъ на менструацію, какъ на процессъ секреторный, существующій для освобожденія женскаго организма отъ накапливающихся въ крови ненужныхъ веществъ. Процессъ этотъ подобенъ процессамъ потоотдѣленія и мочеотдѣленія. При тѣхъ