

РЕФЕРАТЫ.

Обзоръ Акушерско-Гинекологической литературы:

а) Русской.

86. А. А. Максимовъ.—О нѣкоторыхъ клѣточныхъ формахъ послѣда кроликовъ. — (Журн. Русск. Общ. Охран. Нар. Здравія, 1897 г., № 12, стр. 736).

Авторъ обращаетъ вниманіе на работу *Duvall*'я, прослѣдившаго развитіе послѣда у кроликовъ и другихъ грызуновъ. На мѣстѣ развивающагося послѣда эпителий эктодермы яйца, расположившись на измѣненной соединительной ткани слизистой оболочки матки, приобретаетъ характеръ общей протоплазматической массы съ ядрами, но безъ клѣточныхъ очертаній. Эта протоплазматическая масса, пласмодій, окутываетъ большія гликогенныя клѣтки соединительной ткани слизистой оболочки и постепенно какъ-бы рассасываетъ ихъ. Одними изъ энергичныхъ дѣятелей при разрушеніи и рассасываніи эпителия слизистой оболочки матки являются подвижныя гигантскія многоядерныя клѣтки, развивающіяся въ *periplacenta*. Кромѣ описанныхъ элементовъ, въ слизистой оболочкѣ матки, на мѣстѣ послѣда, развиваются колоссальной величины клѣтки, частью изъ соединительной ткани, частью изъ мышечной. Особенно тѣсно связаны онѣ со стѣнками волосныхъ сосудовъ. Къ концу беременности клѣтки подвергаются обратному развитію. Значеніе и функція ихъ еще неизвѣстна.

Н. Какушкинъ.

87. Л. Н. Варнекъ.—О распознаваніи и лѣченіи раннихъ стадій рака матки. — (Врачебныя Записки, 1897 г., № 18, с. 315).

Говоря объ этиологіи рака, авторъ цитируетъ, между прочимъ, мнѣніе *Bäcker*'а, что воспалительныя измѣненія слизистой обо-

лочки матки, являющіяся плодомъ частыхъ родовъ, благопріятствуютъ развитію рака матки. Поэтому, сопоставляя жалобы больныхъ съ извѣстными анамнестическими данными, можно въ извѣстныхъ случаяхъ рано заподозрить злокачественное пораженіе матки. Мимоходомъ авторъ упоминаетъ объ одномъ, по его мнѣнію, постоянномъ признакѣ начального стадія развитія рака, объ учащеніи мочеиспусканія у больныхъ. Далѣе онъ говоритъ объ объективныхъ признакахъ, позволяющихъ отличить начинающееся раковое новообразование отъ *ulcus rodens*, бугорчатой язвы, мягкаго и твердаго шанкровъ, и о необходимости распознавательнаго выскабливанія, особенно если имѣется пораженіе полости матки. Наличие пораженія клѣтчатки таза опредѣляется на основаніи невозможности свести другъ съ другомъ изслѣдующіе пальцы; степень подвижности матки при этомъ не играетъ рѣшающаго значенія. Самымъ удобнымъ способомъ леченія раннихъ стадій рака авторъ признаетъ удаление пѣбликомъ матки чрезъ влагалище. Онъ—большой сторонникъ зажимовъ при этой операціи и лучшимъ способомъ вылушенія считаетъ способъ *Doyen'a*. По его мнѣнію, лигатурный способъ при удаленіи раковой матки вреденъ тѣмъ, что замедляетъ операцію, даетъ благопріятныя условія для прививки раковаго яда (при наложеніи нитей) и влечетъ за собой продолжительное заживленіе культи.

Н. Какушкинъ.

88. Я. В. Эйгеръ.—Современное состояніе вопроса о терапевтическомъ примѣненіи яичника.—(Современная Медицина и Гигіена. 1898 г., № 1).

Авторъ сообщаетъ о болѣе или менѣе благопріятныхъ результатахъ примѣненія яичниковаго вещества *при естественномъ и искусственномъ климактеріи*, добытыхъ *Mainzer'омъ, Hrobak'омъ, Muret, Jayle'емъ, Lissac'омъ, Mond'омъ, Jakobs'омъ, Touvenaint'омъ и Tambroni*. Онъ приводитъ далѣе, повидимому, тоже благопріятныя наблюденія надъ дѣйствіемъ того-же вещества *при отсутствіи мѣсячныхъ, болѣзненныхъ и обильныхъ (Mainzer, Mond, Jakobs, Touvenaint, Jayle), при блѣдной немочи (Spillmann и Etienne, Muret, Fideli и др.), при неврозахъ (Jakobs, Bidon), при Базедовой болѣзни (Jayle, Senator, Seeligmann), при остеомалации (Senator, Latzko и Schnitzler)*. При всѣхъ этихъ страданіяхъ дѣйствіе яичниковаго вещества не болѣе, какъ палліативное. Число наблюденій вообще очень незначительно. Вліяніе оофорина на обмѣнъ веществъ (*Senator*) сказывается повышеніемъ его. Въ настоящее