

разныхъ клиникъ, видно, что одно изъ важныхъ достоинствъ его—не вызывать у дѣтей разстройствъ пищеваренія, даже такихъ невинныхъ, какъ запоръ и вздутіе кишекъ газами. Рядомъ съ хорошей усвояемостью молока стоитъ его безусловная питательность, ибо въ громадномъ большинствѣ случаевъ, при исключительномъ примѣненіи этого молока, имѣлось быстрое повышеніе вѣса даже недоносковъ.

*Н. Какушкинъ.*

158. **H. Dauchet. Des irrégularités menstruelles et en particulier des ménorragies au début de la puberté.**—(La Ssemaine gynécologique. 1897 г. № 25, стр. 193.)—**Неправильности мѣсячныхъ, въ частности усиленные мѣсячныя, въ началѣ половой зрѣлости.**

На 308 случаевъ безусловно правильныя мѣсячныя въ первый годъ половой зрѣлости наблюдались у 176 дѣвицъ, у остальныхъ наблюдались: отсутствіе мѣсячныхъ 56 разъ, болѣзненные мѣсячныя 34 раза и усиленные мѣсячныя 42 раза. У нѣкоторыхъ женщинъ отмѣченныя неправильности продолжали существовать и въ дальнѣйшей ихъ жизни: аменоррея 14 разъ, дисменоррея 12 разъ и меноррагія 28 разъ. Временная дизменоррея вызывалась препятствіями для истеченія крови трехъ родовъ: скопленіемъ сгустковъ крови, узкостью или судорожнымъ сокращеніемъ шейечнаго просвѣта и искривленіями матки; излѣчивалась или искусственнымъ расширеніемъ канала, или беременностью. Усиленные мѣсячныя зависѣли: отъ гипертрофіи шейки матки (3 случая), отъ полиповидныхъ разраженій (2 случая), отъ фиброміомъ матки (2 случая), отъ метрита при общей наклонности къ кровоточивости (3 случая), отъ хлоро-анеміи и сосудистыхъ разстройствъ (18 случаевъ). Въ случаяхъ, гдѣ дѣйствовала послѣдняя причина или метритъ, меноррагія имѣла наклонность къ произвольному самоизлѣченію съ возрастомъ. Въ остальныхъ случаяхъ требовалось оперативное вмѣшательство. Авторъ подмѣтилъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ меноррагіи наслѣдственную наклонность къ ней. Онъ описываетъ въ статьѣ 4 случая усиленныхъ мѣсячныхъ, наблюдавшихся у дѣвицъ въ началѣ половой зрѣлости. Въ двухъ изъ нихъ отмѣчено наслѣдственное предрасположеніе къ кровопотерямъ, въ одномъ оказалась въ послѣдствіи фиброміома, а въ четвертомъ (временная меноррагія) причина не указана. Изъ лѣкарственныхъ средствъ противъ кровопотерь во время мѣсячныхъ авторъ хвалитъ солянокислый гидрастининъ, употребляемый подкожно въ 10%—растворѣ.

*Н. Какушкинъ.*