

161. P. Budin. Sur la quantité de lait produite par les nourrices.—(l'obstétrique. 1897 г. № 5, с. 397).—О количествѣ молока у кормилицъ.

Въ отдѣлениі для недоносковъ 14 кормилицъ, кормившія 14 собственныхыхъ дѣтей и 50 призрѣваемыхъ и исполнявшія при этомъ разныя работы по отдѣлению, истощались и не могли доставить достаточнаго питательнаго матеріала для дѣтей. Тогда количество недоносковъ на то же число кормилицъ было уменьшено до 40. Резултаты получились удовлетворительные. Взвѣшивая дѣтей до сосанія и послѣ опредѣляя такимъ образомъ количество высосанного молока, авторъ подмѣтилъ, что количество этого молока, какъ въ отдѣльности у каждой кормилицы, такъ и у всѣхъ вмѣстѣ быстро возрастаю, начиная съ момента поступленія кормилицъ въ отдѣленіе, въ теченіе около 2 мѣсяцевъ. Затѣмъ въ теченіе около $1\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ, при развившейся эпидеміи гриппа, унесшаго въ могилу многихъ дѣтей, количество это упало (въ среднемъ съ 2270 грам. суточнаго количества у каждой кормилицы до 1431 грам.), а послѣ, въ теченіе $1\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ, снова возросло (въ среднемъ до 1612 грам.). На вопросъ, могло ли бы возрастать количество вырабатываемаго молока у кормилицъ, которая при поступленіи въ отдѣленіе для недоносковъ кормили бы лишь этихъ послѣднихъ, а своихъ бросали бы кормить, авторъ отвѣчаетъ отрицательно: возрастаніе молока зависитъ въ такихъ случаяхъ оттого, что при увеличившейся потребности въ немъ, собственные дѣти кормилицъ своимъ сосаніемъ возбуждаютъ дѣятельность железъ. Поэтому авторъ совѣтуетъ при отдаче слабаго ребенка кормилицѣ заставлять послѣднюю нѣкоторое время продолжать кормить собственнаго ребенка.

H. Какушинъ.

162. Fieux. Antipyrine et lactation.—(Arch. cliniques de Bordeaux. 1897 г. № 10, с. 458).—Вліяніе антипирина на молоко и на выработку его.

Антипиринъ былъ предложенъ Chourr омъ рѣ 1877 году противъ болѣзнейныхъ схватокъ послѣ родовъ. Съ той поры Rivière, Touin, Philips, Guibert, Roncaglia, Tenin, Pinzani, Boissard изслѣдовали вліяніе антипирина на составъ и отдѣленіе молока и приходили къ весьма различнымъ выводамъ. Авторъ провѣрилъ эти наблюденія надъ 10 родильницами (3—6 дней спустя послѣ родовъ), давая имъ по 1 грамму этого средства заразъ съ 2—часовыми промежутками (2 раза въ сутки). 10 кб. снтм. испытуемаго молока онъ смѣшивалъ съ 2,5 кб. снтм. фосфорнокислаго