

164. Apostoli.—Des interventions opératoires dans les fibromes utérins silencieux, après la ménopause. Réflexions sur leur opportunité et leur légitimité.—(La France médicale et Paris médical. 1897 г., № 44, с. 689).—Умѣстно, или нѣтъ хирургическое вмѣшательство при фибромомахъ матки, не дающихъ припадковъ, въ старческомъ возрастѣ?

Больная 57 лѣтъ, уже 2 года не носящая кровей, никогда не страдавшая ни болями внизу живота, ни маточными кровотечениями, была подвергнута операциіи полнаго удаленія матки и придатковъ (черезъ влагалище), потому что врачъ, изслѣдовавшій болѣвую, опредѣлилъ у нея фибромому матки. Вырѣзанная матка оказалась пораженнаю 5—6 маленьками опухолями. Поводомъ къ тщательному изслѣдованію больной послужили ея жалобы на цѣлый рядъ нервныхъ страданій, болѣй главнымъ образомъ въ головѣ и во всемъ тѣлѣ, упадка силы и питанія и т. под. Послѣ операциіи больная стала чувствовать себя значительно лучше. Авторъ, принимая во вниманіе, что въ анампезѣ больной былъ рядъ указаній на истеричность больной (она, между прочимъ, страшно желая ребенка, въ теченіе 9 мѣсяцевъ испытывала воображаемую беременность, grossesse nerveuse!), отнесъ и страданія, послужившія поводомъ къ кореннѣй операциіи,—проявлениами ея истеріи. Операциія, конечно, подействовала на болѣвую, какъ извѣстнаго сорта внушеніе, тѣмъ болѣе, что врачъ указалъ больной на болѣзнь ея матки, болѣзнь, ничѣмъ инымъ не проявившуюся. По меньшей мѣрѣ, говоритъ авторъ, здѣсь слѣдовало-бы испытать цѣлый рядъ физическихъ средствъ лѣченія, сохраняющаго свойства, подвергать же болѣвую опасности кореннаго хирургического вмѣшательства не было никакихъ показаній. *Н. Какушкинъ.*

165. Fieux.—Du pronostic de l'albuminurie gravidique.—(Arch. cliniques de Bordeaux. 1867 г. № 9, с. 416).—Предсказательное значение бѣлковой мочи у беременныхъ.

Еще *Lefouz* подмѣтилъ уменьшеніе хлористыхъ соединеній въ мочѣ экламптичекъ, а *Bouchard* постепенное или быстрое уменьшеніе содержанія этихъ солей въ мочѣ хроническихъ больныхъ считаетъ признакомъ грядущаго ухудшенія въ ходѣ страданія. Въ 1863 году *Chalvet* и въ 1870 г. *Barlemonet*, изслѣдуя мочу беременныхъ передъ наступленіемъ родовъ, опредѣлили замѣтное увеличеніе количества хлористыхъ соединеній и уменьшеніе количества мочевины. Авторъ провѣрилъ эти изслѣдованія и нашелъ, что ни уменьшенія количества мочевины, ни увеличенія