

время применяется или сухой порошокъ яичника (коровы), или вытяжка его. Суточная доза оофорина опредѣляется въ 0,5—1,0.

Н. Какушкинъ.

89. В. К. Корде.—Случай септического заболѣванія, леченный антистрептококковой сывороткой.—(Отдѣльн. отт.)

Во времена доантисептическія отношеніе числа умершихъ родильницъ къ числу заболѣвшихъ въ Московской клиникѣ равнялось 1 : 10, а за послѣдніе годы это отношеніе = 1 : 15. По автору, оно почти не измѣнилось, потому что у насъ въ рукахъ нѣтъ вѣрнаго средства, могущаго прервать послѣродовое гнилостное заболѣваніе. Случай, описываемый въ статьѣ, касается родильницы 31 года разрѣшившейся въ клиникѣ (въ 12 разъ) двойнями, причемъ, при поперечномъ положеніи второго плода, былъ сдѣланъ поворотъ. Послѣдъ по причинѣ кровотеченія (приращень) отдѣленъ руками. Матка промыта 2⁰/₀ растворомъ лизоля. Съ второго дня послѣ родовъ началось повышеніе температуры тѣла, при явленіяхъ эндометрита. Лѣченіе мѣстное: промыванія матки, смазываніе слизистой іодной настойкой, тампонація полости, постоянное орошеніе. На 6-й день послѣ родовъ—потрясающій знобъ, потеря сознанія, бредъ. Сдѣлано выскабливаніе матки; въ соскобѣ найдены стрептококки. Мѣстныя явленія улучшились, но общее состояніе измѣнилось къ худшему: повторные знобы, рѣзкія колебанія температуры, обычное при гнилокровіи измѣненіе общаго вида больной. Введено 20 куб. см. противустрептококковой сыворотки (на 8-й день послѣ родовъ), что дало эффектъ только въ одномъ отношеніи: не было зноба на другой день. Черезъ день впрыскиваніе повторено, и на слѣдующій день спустилась къ нормѣ температура, поднялся и сдѣлался рѣзкимъ пульсъ, рѣзко улучшился общій видъ больной. Осложненіями впрыскиванія были: крапивная сыпь, зудъ и анестезія кожи, инфильтратъ въ мѣстѣ впрыскиванія. Больная выписалась изъ клиники на 28-й день. Въ статьѣ приведено нѣсколько литературныхъ указаній на опыты съ сывороткой въ различныхъ клиникахъ и лабораторіяхъ.

Н. Какушкинъ.

90. Проф. Н. Н. Феноменовъ.—Къ техникѣ внутрибрюшинныхъ операцій на маткѣ.—(Врачъ. 1897 г., № 51, стр. 1467).

Въ настоящее время авторъ оставилъ все старыя способы обеззараживанія полости матки при подготовленіи послѣдней къ операціи (вылущеніе, надвлагалищное отсѣченіе и проч.) и обезза-