

РЕФЕРАТЫ.

Обзоръ акушерско-гинекологической литературы.

а) Русской.

62. А. Н. Соловьевъ.—Къ лѣченію прямокишечныхъ свищей у женщинъ. (Хирургическая Лѣтопись, 1895 г., кн. 1, стр. 107).

Virgo intacta, 24 лѣтъ. Болѣла тифлитомъ и перитифлитомъ. Образовавшійся гнойникъ прорвался въ прямую кишку. Авторъ, кромѣ послѣдняго, констатировалъ опухоль съ боку матки, величиной съ лимонъ, сообщающуюся съ прямой кишкой вышеуказаннымъ свищемъ. Эта опухоль (гнойникъ) вскрыта со стороны влагалища: разсѣчена дѣвственная плева, сдѣлано 2 надрѣза входа въ рукавъ; затѣмъ надрѣзанъ и отсепаровенъ сводъ влагалища съ правой стороны матки; подъ руководствомъ катетера, введеннаго въ гнойникъ черезъ свищъ, гнойникъ вскрытъ и дренированъ черезъ влагалищную рану. Если-бы не удалось вскрыть гнойника черезъ влагалище, авторъ предполагалъ дойти до него крестцовымъ путемъ (*Kraske*). Больная выздоровѣла. *Н. Какушкинъ.*

63. А. Ѳ. Каблуковъ.—*Graviditas extrauterina tubaria sin;* разрывъ плоднаго мѣшка; чревоувѣченіе *in extremis*; выздоровленіе. (Хирургическая Лѣтопись, 1894 г., кн. 6).

Черезъ мѣсяцъ послѣ срочныхъ обычныхъ кровей (у больной 30 лѣтъ, рожавшей однажды), сильное маточное кровотеченіе и затѣмъ, по прекращеніи кровотеченія, въ теченіе 4 мѣсяцевъ изъ половыхъ органовъ постоянно выдѣлялась слизисто-кровянистая жидкость. Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ внезапныя боли съ явленіями внутренняго кровотеченія и остраго малокровія. Матка