

нашелъ въ одномъ случаѣ никакихъ измѣненій въ печени и считаетъ эту болѣзнь самоотравленіемъ при заболѣваніи почекъ. Двойни составили 1% съ небольшимъ. Въ 19% всѣхъ родовъ были примѣнены акушерскія операціи, преимущественно шиваніе разорванной промежности и наложеніе щипцовъ. Авторъ высказывается за щипцы *Федорова* при высоко-стоящей головкѣ. Отъ послѣродового гнилокротія умерло 2 родильницы (0,25%), заболѣвшія гнилокротіемъ во время родовъ внѣ родильнаго отдѣленія. Число послѣродовыхъ заболѣваній вообще равно 5,0%. Раннее вставаніе послѣ родовъ практиковалось въ отдѣленіи по прежнему безъ дурныхъ послѣдствій. Число родившихся дѣтей равно 788 (на 113,55 мальчиковъ приходится 100 дѣвочекъ). Средній вѣсъ ихъ 3326,7 грм., средній ростъ 50 смт. *Н. Какушкинъ.*

66. П. Я. Тепловъ.—Медицинскій отчетъ по гинекологическому отдѣленію Казанской губернской земской больницы за 1893/4 годъ. (Казань, 1894 г.).

Всего больныхъ было 288. Каждая больная въ среднемъ провела въ больницѣ 21,1 дня. Преобладали русскія крестьянки, мѣщанки, домохозяйки и прислуги. Оперативныхъ пособій было 316. Наичаще дѣлалось выскабливаніе слизистой матки (130), затѣмъ шиваніе разрывовъ шейки (33), чревосѣченіе (22), ампутація маточной шейки, кольпорафія (по 21), операція *Borissowicz'a* (20) и проч. Смертность оперированныхъ = 3,8%. Авторъ послѣдовательно разсматриваетъ каждую операцію, классифицируя соотвѣтствующіе случаи въ таблицахъ. Влагалищное вырѣзываніе матки (15 случ.), преимущественно при ракѣ, дало 13,3% смертности. Наичаще чревосѣченіе дѣлалось при новообразованіяхъ яичниковъ и при болѣзняхъ придатковъ вообще. Процентъ смертности 13,7%. Амбулаторія дала 2494 больныхъ, сдѣлавшихъ 4112 посѣщеній.

Н. Какушкинъ.

67. В. Е. Нешель.—Случай лоносѣченія. (Врачъ, 1895 г., № 1).

Авторъ кратко описываетъ 9 случаевъ этой операціи, собранные имъ въ русской литературѣ. Случай автора слѣдующій. Крестьянка, 30 лѣтъ. Ростъ тѣла 149. Размѣры таза: ср. 28, ср. 25, с. ext. 19, с. diag. 8³/₄. Беременна въ 6-й разъ. Живого ребенка родила только въ первый разъ. Остальные роды велись съ оперативною помощію и давали мертвыхъ плодовъ. Теперь роды наступили въ срокъ. Распознано ягодичное положеніе, при чемъ ягодичы крѣпко вколочены во входъ. Плодъ мертвъ. Низ-