

того же дня сдѣлано промывательное, произведшее желанное дѣйствіе. На 3-й день больную слабило послѣ слабительнаго.

Н. Какушкинъ.

70. П. Я. Теплоуъ.—Объ удаленіи придатковъ матки и ихъ новообразованій черезъ задній сводъ. (Врачъ, 1894 г., № 47).

Авторъ считаетъ способы *Féan'a* и *Dührssen'a* (для лѣченія заболѣваній придатковъ), имѣющими весьма существенные недостатки, въ особенности по сравненію съ операцией черезъ задній сводъ. Послѣдняя операція (*colpotomia posterior*) предложена еще въ 1857 году *W. Atlee*, но до сихъ поръ мало находитъ себѣ сторонниковъ. Авторъ думаетъ, что она завоеуетъ видное мѣсто въ ряду гинекологическихъ операцій. Въ клиникѣ *И. М. Львова* она сдѣлана 36 разъ. Наибольшая изъ удаленныхъ опухолей былъ кожевикъ въ два кулака. Въ трехъ случаяхъ дѣло ограничилось разрушеніемъ сращеній. Во всѣхъ случаяхъ получило выздоровленіе. Показаніями къ операціи авторъ ставитъ: 1) смѣщеніе воспаленныхъ придатковъ въ заднее дугласово пространство съ приращеніями тамъ; 2) кисты до дѣтской головки величиной; 3) плотныя опухоли, лежащія въ заднемъ дугласовомъ пространствѣ, величиной до діаметра разрѣза свода; 4) высоколежащія больныя придатки, легко смѣщающіеся внизъ. Операція состоитъ въ вскрытіи задняго свода до 2½ поперечныхъ пальцевъ, въ разрушеніи сращеній и въ выведеніи придатковъ во влагалище (при чемъ большія кисты прокалываются). Въ чистыхъ случаяхъ тампонируется только влагалище; при большихъ сращеніяхъ, при кровотеченияхъ—и заднее дугласово пространство.

Н. Какушкинъ.

71. М. Гинзбургъ.—Діагностическія задачи по акушерству и гинекологіи. (Еженедѣльникъ, 1894 г., № 49).

Авторъ описываетъ три случая, гдѣ распознаваніе могло быть поставлено лишь съ нѣкоторою вѣроятностью: 1) *Peritonitis puerperalis*? У 35-лѣтней родильницы, на 12-й день послѣ родовъ, развился острый сочленовный ревматизмъ, а затѣмъ выступили на первый планъ явленія перитонита, не имѣвшаго связи съ половымъ аппаратомъ. Авторъ относитъ этотъ перитонитъ къ разряду ревматическихъ. 2) *Erysipelas puerperalis*? У 27-лѣтней первороженицы продолжительные роды, разрывъ промежности (зашитъ). На 2-й день послѣ родовъ краснота вокругъ промежностной раны; краснота распространялась по сосѣдству. Больная сильно худѣла. Лихорадки