

ребляеть только въ крайнихъ случаяхъ, когда пальцевое выскабливаніе дало неполный результатъ, причемъ выскабливаніе ложечкой онъ производитъ всегда подъ руководствомъ пальца. Также предостерегаетъ онъ отъ употребленія пинцетовъ при полномъ выкидышѣ и отъ створчатыхъ металлическихъ расширителей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ задержаніе послѣда при выкидышѣ онъ видѣлъ успѣхъ отъ примѣненія большихъ дозъ (minimum 1,0) сѣрнокислога хинина.

Н. Какушкинъ.

167. **Bimsenstein. Sur un cas d'accouchement. Contracture du col. Inertie utérine.**—(La France médicale et Paris médical. 1898 г. № 4, с. 50).—**Случай родовъ при неподатливости зѣва. Послѣродовое расширение (разслабленіе стѣнокъ?) матки.**

Авторъ наблюдалъ первородящую, 36 лѣтъ, у которой, несмотря на хорошую родовую дѣятельность, зѣвъ не раскрывался въ теченіе 8 часовъ (при наблюденіи больной авторомъ). Онъ сдѣлалъ нѣсколько надрѣзовъ и раскрытіе зѣва началось. Роды всетаки оконченны щипцами, повидимому по причинѣ слабости потужной дѣятельности. Небольшой разрывъ промежности былъ тотчасъ же зашитъ. Послѣродовое время вообще и обратное развитіе матки шло хорошо, но на 15-й день послѣ родовъ авторъ обнаружилъ у больной увеличеніе матки: она дномъ достигала почти до пупка, причемъ другихъ мѣстныхъ явленій никакихъ не было (выдѣленія нормальны). Больная по вечерамъ лихорадила (до 39,5°). Горячія влагалищныя сырнцеванія, хининъ и тоническія средства не давали никакихъ улучшеній; промываніе матки не обнаружило присутствія въ полости ея кровяныхъ сгустковъ (какъ предполагалось было). Черезъ нѣсколько дней, независимо повидимому отъ лѣченія, матка начала уменьшаться и температура палаты. Больная встала на 15 день отъ начала этого заболѣванія.

Н. Какушкинъ.

168. **F. Giraud.—Nouvelles considérations chimiques, physiologiques et cliniques sur le lait de femme dans l'état de santé.**—(Arch. cliniques de Bordeaux. 1897 г. № 7, с. 291).—**Новыя наблюденія надъ молокомъ здоровой женщины.**

Работа автора дѣлится на три части. Въ первой онъ рисуетъ физико-химическія свойства молока. Между прочимъ онъ отмѣчаетъ ошибку у его предшественниковъ по изслѣдованію молока: они не рѣдко смѣшивали изслѣдованія молозива (въ первые 15 дней послѣродового періода) съ изслѣдованіями настоящаго молока.