

плода, такъ что въ данномъ случаѣ улучшение въ состояннн пациентки никакъ нельзя отнести на счетъ уменьшеннн внутрн брюшнаго давленнн и соотвѣтствующихъ измѣненнн въ условняхъ почечнаго кровообращеннн. По мнѣнню автора, улучшение въ состояннн пациентки можно приписать только прекращенню плацентарнаго кровообращеннн, а вмѣстѣ съ тѣмъ и прекращенню отравленнн организма матери токсическими продуктами обмѣна въ плодѣ.

Л. Шейнисъ.

175. **Buë.—Vomissements incoërcibles et môle hydatiforme.**—(Société Obstétricale de France, séance du 24 avril 1897. Semaine Médicale, 1897, стр. 178).—**Неукротимая рвота и пузырный заносъ.**

По поводу двухъ случаевъ, въ которыхъ наблюдалось совпаденнн неукротимой рвоты и обильнаго слюнотеченнн съ существованнемъ пузырнаго заноса, авторъ задаетъ себѣ вопросъ, не стоятъ-ли между собою въ извѣстной зависимости явленнн неукротимой рвоты съ одной стороны и миксоматозное перерожденнн ворсинокъ съ другой.

Budin замѣчаетъ, что ему также пришлось наблюдать случай, въ которомъ упорная неукротимая рвота существовала совмѣстно съ пузырнымъ перерожденнемъ.

Л. Шейнисъ.

176. **Brindeau.—Hydramnios due à un sarcome du rein.**—(Société Obstétricale de France, séance du 24 avril 1897. Semaine Médicale, 1897, стр. 178).—**Водянка яйца въ зависимости отъ саркомы почки.**

У первородящей беременность на 5-мъ мѣсяцѣ была осложнена огромной водянкой яйца, потребовавшей прокола оболочекъ, при чемъ вытекло около 7—8 литровъ жидкости. Послѣдовали роды; плодъ вѣсилъ 1100 граммовъ, послѣдъ—600 грам. Такъ какъ плодъ представлялъ большой животъ, большую селезенку и асцитъ, то былъ заподозрѣнъ сифилисъ, но вскрытнн показало большую саркоматозную почку. Водянка яйца въ данномъ случаѣ должна была произойти, вѣроятно, вслѣдствнн затрудненнаго кровообращеннн въ пупочной венѣ и дѣйствительно, эта послѣдняя была сильно растянута и вспрыскиваемая въ нее жидкость легко фильтрировала на амннотической сторонѣ.

Л. Шейнисъ.