

77. Л. Н. Варнекъ.—Опытъ критической оцѣнки нѣкоторыхъ главныхъ современныхъ способовъ фибротоміи на основаніи собственныхъ 25 операцій. (Хирургическая Лѣтопись, 1895 г., кн. 2).

Наиболѣе употребительные способы въ настоящее время, фибротомія безъ образованія ножки, фибротомія съ внѣбрюшиннымъ укрѣпленіемъ ножки и съ внутрибрюшинномъ уходомъ за ней, испытаны авторомъ въ его случаяхъ. Безъ образованія ножки авторъ оперировалъ три раза (удаленіе опухолей, съ сохраненіемъ матки). Съ внѣбрюшиннымъ укрѣпленіемъ ножки авторъ сдѣлалъ 8 операцій, изъ которыхъ въ семи случаяхъ примѣнилъ способъ *Hegar'a* и въ одномъ способъ *Wölfler'a*. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, за исключеніемъ одного, авторъ, не пришивалъ пристѣнной брюшины вокругъ ножки, а закладывалъ между культей и брюшинными стѣнками полоску іодоформной марли, которая удалялась вмѣстѣ со швами, на 9—10 дней. При этомъ культя каждый разъ прижигалась и густо обемпалась смѣсью дубильной съ салициловой кислотой. Въ случаяхъ съ внутрибрюшиннымъ уходомъ за культей авторъ, по *Schröder'u*, оперировалъ три раза, при чемъ потерялъ одну больную отъ послѣдовательнаго кровотеченія. По *Zweifel'ю* сдѣлано двѣ операціи, при которыхъ одна окончилась смертью вслѣдствіе послѣдовательнаго кровотеченія изъ культы, а другая—отъ паралича сердца. По *Leopold'u* авторъ сдѣлалъ семь операцій. Всѣ больные выздоровѣли, при чемъ 2 раза омертвѣвшая часть культы выдѣлилась наружу черезъ наружное маточное отверстіе, а однажды омертвѣвшая часть культы (со швами) выдѣлилась черезъ брюшной рубецъ. Оскопленіе примѣнено авторомъ въ двухъ случаяхъ, у одной безъ успѣха. Выводы автора таковы. Способъ *Hegar'a* долженъ практиковаться въ исключительныхъ случаяхъ, гдѣ нельзя примѣнить ни внутрибрюшиннаго укрѣпленія культы, ни вылущенія матки. Способы *Schröder'a* и *Zweifel'я* не примѣнимы. Способъ *Leopold'a* является наилучшимъ способомъ. Оскопленіе должно быть оставлено.

Н. Какущинъ.

78. А. Е. Ягодинскій.—Патолого-анатомическія измѣненія головного мозга при послѣродовой эклампсiи. (Врачъ, 1895 г., № 10).

Авторъ изслѣдовалъ мозгъ въ 8 случаяхъ послѣродовой эклампсiи. При изслѣдованіи мозга въ свѣжемъ видѣ авторъ убѣдился въ бѣлковомъ и жировомъ перерожденіяхъ нервныхъ клѣточекъ. При этомъ въ нѣкоторыхъ клѣточкахъ дѣло доходитъ до полного