

б) Французской.

87. H. Lambinon.—Cas rare de grossesse trigémellaire avec rétention prolongée de deux foetus morts dans l'utérus et expulsés a terme a l'état papyracé avec un enfant vivant. (Nouvelles archives d'obstétrique et de gynécologie, 1894 г., № 12). Рѣдкій случай беременности тройнями съ продолжительнымъ задержаніемъ въ маткѣ двухъ мертвыхъ плодовъ, рожденныхъ потомъ въ состояніи крайней атрофіи вмѣстѣ съ третьимъ, живымъ.

Рѣчь идетъ о первобеременной, которая безъ всякихъ осложнений родила въ срокъ живого мальчика вѣсомъ въ 3200 грм. и длиною въ 50 снтм. Черезъ $\frac{3}{4}$ часа послѣ родовъ появилось маточное кровотеченіе, и изъ матки выдѣлился второй послѣдъ, вѣсомъ въ 100 грм., съ двумя мертвыми плодами, изъ которыхъ одинъ былъ длиною въ 13,3 снтм. и вѣсомъ въ 30 грм., а другой въ 13 снтм. и вѣсомъ въ 14 грм. У перваго всѣ органы были на лицо, у втораго органы груди и живота отсутствовали. Послѣдъ живого плода вѣсилъ 501 грм. и имѣлъ въ діаметрѣ 15 снтм. Пуповина его была прикрѣплена оболочечно. *Н. Какучикинъ.*

88. Alf. Puzso.—De la cystotomie préliminaire appliquée au traitement de certaines fistules vésico-génitales et vesico-intestinales. (Archives provinciales de Chirurgie, 1894 г., № 12). О предварительномъ разсѣченіи пузыря съ цѣлью лѣченія пузырно-половыхъ и пузырно-кишечныхъ свищей.

У 6-лѣтней дѣвочки, у которой два года назадъ былъ удаленъ мочепузырный камень, авторъ съ успѣхомъ произвелъ зашиваніе пузырно-влагалищнаго свища, образовавшагося на мѣстѣ изъязвленія, вызваннаго камнемъ. Свищъ номѣщался въ нижнемъ отдѣлѣ пузыря и распространялся на начальную часть мочеиспускательнаго канала. Ввиду узкости влагалища, значительной отечности наружныхъ половыхъ органовъ и входа во влагалище, было примѣнено надлобковое сѣченіе пузыря по обычнымъ приемамъ. Разрѣзъ пузыря (внѣбрюшинно) сдѣланъ по пальцу, введенному черезъ свищъ въ полость пузыря, и равнялся 4 снтм. Послѣ окровавленія краевъ свища, они содьянены кѣтгутовыми швами. Швы проводились такъ: игла съ кѣтгутомъ прокалывалась со стороны пузыря и выводилась черезъ влагалище наружу; для того, чтобы провести