

б) Французской.

87. H. Lambinon.—Cas rare de grossesse trigémellaire avec rétention prolongée de deux foetus morts dans l'utérus et expulsés a terme a l'état papyracé avec un enfant vivant. (Nouvelles archives d'obstétrique et de gynécologie, 1894 г., № 12). Рѣдкій случай беременности тройнями съ продолжительнымъ задержаніемъ въ маткѣ двухъ мертвыхъ плодовъ, рожденныхъ потомъ въ состояніи крайней атрофіи вмѣстѣ съ третьимъ, живымъ.

Рѣчь идетъ о первобеременной, которая безъ всякихъ осложнений родила въ срокъ живого мальчика вѣсомъ въ 3200 грм. и длиною въ 50 снтм. Черезъ $\frac{3}{4}$ часа послѣ родовъ появилось маточное кровотеченіе, и изъ матки выдѣлился второй послѣдъ, вѣсомъ въ 100 грм., съ двумя мертвыми плодами, изъ которыхъ одинъ былъ длиною въ 13,3 снтм. и вѣсомъ въ 30 грм., а другой въ 13 снтм. и вѣсомъ въ 14 грм. У перваго всѣ органы были на лицо, у втораго органы груди и живота отсутствовали. Послѣдъ живого плода вѣсилъ 501 грм. и имѣлъ въ діаметрѣ 15 снтм. Пуповина его была прикрѣплена оболочечно. *Н. Какучикинъ.*

88. Alf. Puzso.—De la cystotomie préliminaire appliquée au traitement de certaines fistules vésico-génitales et vesico-intestinales. (Archives provinciales de Chirurgie, 1894 г., № 12). О предварительномъ разсѣченіи пузыря съ цѣлью лѣченія пузырно-половыхъ и пузырно-кишечныхъ свищей.

У 6-лѣтней дѣвочки, у которой два года назадъ былъ удаленъ мочепузырный камень, авторъ съ успѣхомъ произвелъ зашиваніе пузырно-влагалищнаго свища, образовавшагося на мѣстѣ изъязвленія, вызваннаго камнемъ. Свищъ номѣщался въ нижнемъ отдѣлѣ пузыря и распространялся на начальную часть мочеиспускательнаго канала. Ввиду узкости влагалища, значительной отечности наружныхъ половыхъ органовъ и входа во влагалище, было примѣнено надлобковое сѣченіе пузыря по обычнымъ приемамъ. Разрѣзъ пузыря (внѣбрюшинно) сдѣланъ по пальцу, введенному черезъ свищъ въ полость пузыря, и равнялся 4 снтм. Послѣ окровавленія краевъ свища, они содьянены кѣтгутовыми швами. Швы проводились такъ: игла съ кѣтгутомъ прокалывалась со стороны пузыря и выводилась черезъ влагалище наружу; для того, чтобы провести

черезъ другой край свища конецъ этой катгутовой нити обратно въ пузырь,—черезъ противоположный край свища проводилась со стороны пузыря шелковая нить и, выведенная черезъ влагалище наружу, связывалась узломъ съ ранѣ проведенной катгутовой нитью; послѣдняя затѣмъ за шелковую нить продергивалась въ полость пузыря и связывалась съ противоположнымъ своимъ концомъ. Въ мочеиспускательный каналъ былъ введенъ катетеръ à demeure, а въ нижній уголъ пузырьной раны—дренажъ. Заро- шение свища, за исключеніемъ ничтожнаго точечнаго пространства въ области мочеиспускательнаго канала, произошло быстро; нор- мальная дѣятельность пузыря и канала возстановились.

На основаніи своего случая и девяти другихъ (*Trendelenburg, Baum, Bardenhauer, Leopold, Mac Gill*), давшихъ въ общемъ семь вполне успѣшныхъ исходовъ, авторъ высказывается за испы- танный имъ способъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ доступъ къ свищу со стороны влагалища очень труденъ и гдѣ свищъ, вслѣдствіе рубцовыхъ измѣненій, отличается своею неподвижностью.

Н. Какушкинъ.

89. **Ledrain.**—**Accouchement par le siège. Pieds bots. Spina bifida. Hydrocéphalie.** (Le Progrès médical, 1894 г., № 40). Роды при ягодичномъ предлежаніи. Плодъ съ искривленными ногами, съ расщепленіемъ позвоночника и съ водянкой головы.

У первородящей, 19 лѣтъ, (беременна на 8 мѣсяцѣ) опухоль въ верхнемъ отдѣлѣ позвоночника плода, представила препятствіе для выхожденія послѣдняго, при чемъ замѣчено, что эта опухоль увели- чивается при каждомъ сокращеніи матки. Явилась мысль, что содер- жимое ея имѣетъ связь съ таковымъ же полости черепа. Позвоночни- ковая опухоль была вскрыта, при чемъ по мѣрѣ истеченія жидкости уменьшался объемъ и головки. Это дало возможность благополучно кончить роды.

Н. Какушкинъ.

90. **M. Oui.**—**Insertion vicieuse du placenta sans rupture préalable des membranes. Emploi du ballon de Champetier de Ribes.** (La Presse médicale, 1894 г., 3 novembre). Примѣненіе баллона *Champetier de Ribes*'а при предлежаніи послѣда.

При кровотеченіяхъ, вслѣдствіе предлежанія послѣда, оказы- вается очень удобнымъ баллонъ *Champetier de Ribes*'а, предложен- ный авторомъ первоначально для вызванія искусственныхъ преж- девременныхъ родовъ. При мало открытомъ зѣвѣ, когда оболочки еще цѣлы, онъ легко вводится въ матку и, наполненный жид-